

外科护理学

习 题 集

医护学习网 www.mednur.com

病理学园地 www.binglixue.com

第一章 绪论

1. 外科疾病的分类中不包括
A. 感染 B. 创伤 C. 肿瘤 D. 溃疡 E. 功能障碍性疾病
2. “以人的健康为中心的全面护理”是
A. 护理程序 B. 整体护理 C. 三级预防 D. 护理概念 E. 护理理论
3. 学习外科护理学应做到：
A. 树立正确的人生观和价值观 B. 以现代护理观为指导
C. 注重理论与实践相结合 D. 不断更新知识 E. 以上均是
4. 外科护士应具备的职业素质包括
A. 思想品德素质 B. 文化业务素质 C. 身体心理素质
D. 业务技能素质 E. 以上均是

第二章 体液平衡失调病人的护理

1. 正常人每日生理需要的水摄入量是
A. 500-1000ml B. 1000-1500ml C. 1500-2000ml
D. 2000-2500ml E. 3000-4000ml
2. 脱水患者大量输入生理盐水会出现
A. 低钾性碱中毒 B. 高钾性酸中毒 C. 代谢性酸中毒
D. 低氯性碱中毒 E. 高氯性酸中毒
3. 高渗性脱水最早的症状是
A. 黏膜干燥 B. 皮肤弹性减退 C. 口渴 D. 眼窝凹陷 E. 体温升高
4. 正常成人每日需要的钾盐量为
A. 1-1.5g B. 2-3g C. 3.5-4g D. 5-6g E. 7-8g
5. 细胞外液的主要阳离子是
A. K^+ B. Na^+ C. Ca^{2+} D. Mg^{2+} E. Fe^{2+}
6. 正常成人每日非显性失水量为
A. 200ml B. 850ml C. 400ml D. 1000ml E. 1200ml
7. 等渗性脱水，哪项是错误的
A. 外科临床最多见 B. 水钠急剧丧失 C. 血清钠明显降低 D. 有轻度口渴
E. 又称急性缺水或混合性缺水
8. 体液失衡的补液治疗，经计算所得的补液量，第一天应补
A. 一次补完 B. 先补充 1/3，再加当日生理需要量 2000ml
C. 先补充 1/4，再加当日生理需要量 2000ml
D. 先补充 1/2，再加当日生理需要量 2000ml
E. 先补充 2/3，再加当日生理需要量 2000ml
9. 机体调节酸碱平衡最迅速的一条途径是：
A. 肺的调节 B. 血液缓冲系统 C. 细胞内外离子交换

- D. 肾脏的调节 E. 神经-内分泌的调节
10. 在输液时发现病人呼吸急促、咳嗽、咳大量血性泡沫痰，应立即
A. 吸痰 B. 加快输液 C. 应用抗过敏药物
D. 停止输液 E. 先观察，暂不采取措施
11. 低渗性脱水时，体液的容量改变为
A. 细胞外液正常，细胞内液减少 B. 细胞外液减少，细胞内液正常
C. 胞外液显著减少，细胞内液轻度减 D. 胞外液轻度减少，细胞内液显著减少
12. 对急性消化道失液的患者，医嘱有下列液体，应首先输入的是
A 5%葡萄糖盐水 B 5%葡萄糖液 C 10%葡萄糖液
D 右旋糖酐 E 5%碳酸氢钠
13. 细胞内液最主要的阳离子为
A. K^+ B. Ca^{2+} C. Na^+ D. P^{2+} E. Mg^{2+}
14. 下列哪项不属于高渗性缺水的病人的常见临床表现：
A. 烦躁 B. 口渴 C. 粘膜干燥 D. 尿量增多 E. 皮肤弹性下降
15. 若将体内每日的代谢产物经肾脏排出、至少需要的尿量为
A. 100-200ml B. 300-400ml C. 500-600ml D. 800-1000ml
E. 1000-1500ml
16. 严重高渗性脱水病人首选的补液是
A. 生理盐水 B. 平衡盐溶液
C. 5%葡萄糖溶液 D. 5% $NaHCO_3$ 溶液 E. 5%葡萄糖盐水
17. 临床最常见的等渗性脱水的原因是
A. 水分摄入不足 B. 水分丢失过多
C. 补充等渗溶液丢失 D. 消化液长期慢性丢失
E. 消化液的急性丧失
18. 严重低渗性脱水首先补充
A. 0.9%氯化钠 B. 5%氯化钠 C. 5%葡萄糖等渗盐水
D. 5%葡萄糖 E. 10%葡萄糖
19. 下列有关水钠代谢失衡的叙述哪项错误
A. 高渗性缺水可致细胞外液量少于细胞内液量
B. 低渗性缺水早期尿量不减 C. 水潴留循环血量过多称水中毒
D. 低渗性缺水以循环衰竭为主
E. 等渗性缺水是外科病人最易发生的缺水
20. 重度等渗性脱水性病人，需输下列三种液体：①5%葡萄糖；②右旋糖苷；③5%葡萄糖等渗盐水，恰当的输入顺序是
A. ①→②→③ B. ③→①→② C. ②→③→①
D. ③→②→① E. ②→①→③
21. 高渗性脱水时体液变化是
A 细胞内、外液体均轻度减少 B 细胞内液显著减少，细胞外液稍减少
C 细胞外液减少，细胞内液正常 D 细胞外液显著减少，细胞内液稍减少
E 以上都不是

22. 急性肠梗阻病人, 今日尿量 1500ml, 呕吐 250ml, 胃肠减压液约 1000ml, 无发热, 无排便。其 24h 的液体排出量为

- A. 2750ml B. 3050ml C. 3250 D. 3600ml E. 4750ml

23. 一气管切开病人, 体重 60kg, 体温 39°C, 禁食。第 1 个 24h 补液量约为

- A. 1500—2000ml B. 2000—2500ml C. 2500—3000ml D. 3000—3500ml
E. 3500—4000ml

(24-26 题)

男性病人, 25 岁, 因高热 2 日未能进食, 自述口渴、口干、尿少色黄。查体: 口舌干燥, 皮肤弹性差, 眼窝凹陷。实验室检查: 尿比重 1.028, 血清钠浓度为 155mmol/L.

24. 考虑病人出现

- A. 等渗性脱水 B. 低渗性脱水 C. 轻度高渗性脱水
D. 中度高渗性脱水 E. 重度高渗性脱水

25. 该病人首先应给输入

- A. 3%—5%的氯化钠溶液 B. 5%碳酸氢钠深液
C. 5%葡萄糖溶液 D. 葡萄糖盐水 E. 平衡液

26. 病人体重 60kg, 体温持续 39°C, 晚间用药退热后, 大汗淋漓, 湿透一身衬衣裤, 估计其额外失水约为

- A. 500ml B. 1000ml C. 1500ml D. 2000ml E. 2500ml

27. 维持正常人体液酸碱平衡的缓冲系统中最重要的是

- A. 磷酸盐系统 B. 碳酸氢盐系统
C. 血红蛋白系统 D. 血浆蛋白系统 E. 肾调节

(28-31 题)

- A. 高渗性脱水 B. 低渗性脱水 C. 等渗性脱水 D. 高钾血症 E. 低钾血症

28. 外科最常见的脱水类型

29. 心电图检查显示高而尖 T 波, 提示

30. 昏迷. 拒食病人导致

31. 碱中毒患者可引起

(32-34 题)

- A 等渗脱水 B 低渗脱水 C 高渗脱水 D 水中毒 E 以上都不是

32. 明显口渴, 尿量极少, 尿钠升高, 尿比重升高:

33. 不口渴, 尿量减少, 尿钠减少, 尿比重下降

34. 有口渴, 尿量减少, 尿钠正常, 尿比重升高

(35-36题)

- A. 低渗性脱水 B. 等渗性脱水 C. 高渗性脱水 D. 低钾血症 E. 高钾血症

35. 急性肠梗阻, 大量呕吐, 脉搏细弱, 血压下降

36. 长期禁食, 每日通过静脉补液, 四肢软瘫, 肠麻痹

37. 关于低钾血症下列哪项是错误的

- A. 常见于胃肠道失液 B 常出现腹胀及肠麻痹

- C. 应自静脉内迅速大量补充钾溶液 D. 肾功能衰竭时限制补钾
E. 严重时出现心脏骤停
38. 可引起高血钾的情况是
A. 禁食 B. 挤压伤 C. 呕吐
D. 代谢性碱中毒 E. 摄入大量含钾食物
39. 1000ml 生理盐水中最多可加入 10%氯化钾的量是
A. 15ml B. 20ml C. 30ml D. 40ml E. 50ml
40. 输入储存过久的库存血时, 易引起
A. 高钠血症 B. 低钙血症 C. 高钾血症 D. 低钾血症 E. 低钠血症
41. 不符合静脉补钾原则的是
A. 尿量必须 $>30\text{ml/h}$ B. 输液中氯化钾浓度 $<0.3\%$ C. 滴速 <60 滴/分
D. 每日补钾总量 $<6-8\text{g}$ E. 可先静脉推注少量 10%氯化钾
42. 将 10%氯化钾 30ml 稀释于 5%葡萄糖溶液中, 下列哪份稀释液量最合适
A. 200ml B. 600ml C. 400ml D. 800ml E. 1000ml
43. 在同样禁钾情况下, 人体最易缺乏的电解质是
A. 钾 B. 钠 C. 钙 D. 镁 E. 磷
44. 低钾血症的临床表现不包括
A. 腹胀 B. 表情淡漠, 乏力
C. 腱反射亢进 D. 反常酸性尿 E. 心音低钝
45. 低钾血症病人补钾最安全的途径是
A. 口服 B. 肌内注射 C. 静脉滴注 D. 静脉注射 E. 以上说法都不对
46. 禁食病人无其他额外失钾者, 每天补钾
A. 2-3g B. 4-5g C. 6-8g D. 9-12g E. 12-15g
47. 对高钾血症引起心率失常者, 首要措施是静脉给予
A. 10%葡萄糖酸钙 B. 5%碳酸氢钠 C. 50%葡萄糖加胰岛素
D. 等渗盐水 E. 以上均可
48. 低钾血症补钾时, 下列哪项错误
A. 5%葡萄糖液 500ml 加 10%氯化钾 1.5g 静脉滴注
B. 尿量每小时大于 30ml 时才可补钾 C. 静脉滴注速度每分钟 60 滴之内
D. 血钾过低时可将 10%氯化钾静脉滴注
E. 严重缺钾病人每天补钾总量不超过 6-8g
49. 李先生, 因下肢挤压伤致血清钾升高, 出现心动过缓, 心律不齐。应选用的药物是
A. 毛花子甙丙(西地兰) B. 普萘洛尔(心得安)
C. 利多卡因 D. 5%碳酸氢钠 E. 10%葡萄糖酸钙
50. 某车祸病人因大量出血, 急诊入院后输入3000ml库存血, 病人诉乏力, 手足麻木, 心率50次/分, 血压90/60mmHg, 血清钾 5.9mmol/L , 病人可能出现的情况是
A. 出血性休克 B. 低钾血症 C. 高钾血症
D. 等渗性脱水 E. 高渗性脱水

(51-52 题)

某成年病人，腹部手术后禁食，胃肠减压 4d，每天输入 10%葡萄糖溶液 2000ml，5%葡萄糖等渗盐水 1000ml，尿量每天 1800ml。病人诉乏力、嗜睡、腹胀、恶心，心率 120 次/min。

51. 病人可能出现的情况是
A. 失血性休克 B. 低钾血症 C. 高钾血症
D. 等渗性脱水 E. 低渗性脱水
52. 请考虑应给病人补充下列何种液体
A. 10%葡萄糖溶液 B. 10%氯化钾溶液 C. 10%氢氧化钾溶液
D. 5%碳酸氢钠溶液 E. 0.9%氯化钠溶液
53. 幽门梗阻患者长期呕吐可引起的水电解质酸碱失衡的类型是
A 低氯低钾代谢性碱中毒 B 低氯高钾代谢性碱中毒
C 低氯低钾代谢性酸中毒 D 高氯低钾代谢性酸中毒
E 低氯高钾代谢性碱中毒
54. 纠正代谢性酸中毒首选
A. 11.2%乳酸钠 B. 5%葡萄糖溶液+氯化钾 C. 3.6%三羟甲基氨基甲烷
D. 0.9%氯化钠 E. 5%碳酸氢钠
55. 关于代谢性酸中毒的病因，下列哪项是错误的
A. 主要发生于呼吸道梗阻 B. 主要由于体内 HCO_3^- 减少
C. 可见于急性肾功能衰竭时 D. 可发生于肠道液体大量丧失时
E. 可见于严重感染时
56. 代谢性酸中毒的最突出最典型的临床表现是：
A. 呼吸浅慢 B. 呼吸深快 C. 血二氧化碳结合力升高
D. 尿呈碱性 E. pH 值升高
57. 口唇呈樱红色，提示哪种酸碱平衡紊乱
A 代谢性酸中毒 B 代谢性碱中毒 C 呼吸性酸中毒
D 呼吸性碱中毒 E 混合性酸碱
58. 下列情况与低钾血症不符的是
A. 四肢软弱无力 B. 肠鸣音减弱
C. 血压下降 D. 恶心呕吐 E. 心电图 T 波高尖
- 59-62 题
A. 代谢性碱中毒 B. 代谢性酸中毒 C. 高钾血症
D. 呼吸性碱中毒 E. 呼吸性酸中毒
59. 手术后并发肺炎的病人可发生
60. 幽门梗阻病人可发生
61. 肠痿病人可发生
62. 挤压综合症病人可发生

第三章 外科休克病人的护理

1. 给休克病人快速大量输血补液时，掌握量和速度，根据哪一项指标最可靠
A. 颈静脉充盈情况 B. 面色和肢端温度 C. 血压和脉搏

- D. 尿量和中心静脉压 E. 根据已丧失量
2. 下列哪项符合早期休克
- A. 面色苍白, 烦躁不安 B. 脉弱无力 C. 血压降低
D. 代谢性酸中毒 E. 皮肤粘膜出现瘀斑
3. 休克病人微循环衰竭期的典型表现是
- A. 表情淡漠 B. 皮肤苍白 C. 尿量减少 D. 血压下降 E. 全身广泛出血
4. 抗休克首要而基本的措施是
- A. 补充血容量 B. 改善心功能 C. 纠正酸中毒
D. 改善周围血管张力 E. 防治急性肾功能衰竭
5. 休克早期的临床表现是
- A. 表情淡漠 B. 发绀, 四肢厥冷 C. 血压下降, 脉速 D. 脉压小, 尿量减少
E. 抽血时因血液黏稠易凝
6. 一位休克病人突然中心静脉压为 $15\text{cmH}_2\text{O}$, 血压低则表示
- A. 心功能不全 B. 肾功能不全 C. 肺功能不全
D. 脑功能不全 E. 肝功能不全
7. 休克病人, 护士抽血时不易抽出, 易凝固, 皮肤有出血瘀点、紫斑, 伤口、注射部位出血, 应考虑
- A. 呼吸窘迫综合征 B. 急性肾衰 C. 肝功能衰竭
D. 弥散性血管内凝血 E. 心功能衰竭
8. 上消化道大出血伴休克时的首要护理措施是
- A. 安定病人情绪 B. 准备急救用品 C. 建立静脉通路
D. 迅速配血 E. 按医嘱采取止血措施
9. 观察休克患者的组织灌流量最可靠的指标是:
- A. 血压 B. 脉率 C. 呼吸 D. 神志 E. 尿量
10. 休克早期血压及脉搏的变化是:
- A. 收缩压下降, 舒张压下降, 脉搏细速
B. 收缩压正常, 舒张压下降, 脉搏细速
C. 收缩压正常, 舒张压升高, 脉搏徐缓
D. 收缩压正常, 舒张压升高, 脉搏增快
E. 收缩压增高, 舒张压正常, 脉搏细速
11. 成人尿量在多少以上表明休克已得到纠正
- A. 20ml/h B. 30ml/h C. 40ml/h D. 50ml/h E. 60ml/h
12. 休克病人的护理措施, 下列错误的是
- A. 应用血管活性药物应在扩容之后 B. 应用血管活性药物应从低浓度慢速开始
C. 输液时严防液体外渗 D. 体温下降时应用热水袋加温
E. 使用强心药时应进行心电监测
13. 休克早期的表现不正确的是
- A. 精神兴奋 B. 面色苍白
C. 血压下降 D. 脉搏增快 E. 尿量减少

14. 有效循环血量是指
A. 血容量 B. 循环血量 C. 肝脾骨髓中的血量 D. 心排出量
E. 单位时间内通过心血管系统循环的血量
15. 休克患者最适宜的体位是
A. 头低足高位 B. 平卧位 C. 半卧位
D. 平卧将上身和下肢各抬高 $10^{\circ} - 30^{\circ}$
16. 监测休克病情变化最简便有效的指标是
A. 生命体征 B. 神志 C. 皮肤色泽与肢端温度
D. 中心静脉压 E. 尿量
17. 下列哪种情况提示休克患者血容量不足，可加快输液
A. $CVP < 5\text{cmH}_2\text{O}$ ，血压降低 B. CVP 正常，血压正常
C. $CVP > 15\text{cmH}_2\text{O}$ ，血压降低 D. $CVP > 15\text{cmH}_2\text{O}$ ，血压正常
E. CVP 正常，血压降低
18. 休克代偿期的临床表现
A. 血压稍升高，脉搏、脉压正常 B. 血压稍降低，脉搏、脉压正常
C. 血压稍降低，脉搏快、脉压减小 D. 血压稍升高，脉搏快、脉压减小
E. 血压稍升高，脉搏快、脉压基本不变
19. 对中心静脉压和血压均低于正常值的休克病人，应采取的措施是
A. 大量输液，加快滴速 B. 控制滴速，减慢输液
C. 暂停输液，用强心剂 D. 用升压药物 E. 用扩血管药物
20. 休克经处理后，微循环改善的最重要的指标是：
A. 神志恢复清楚 B. 皮肤颜色转红 C. 肢端温度上升
D. 血压回升 E. 尿量增多
21. 各型休克的共同特点是
A. 血压下降 B. 中心静脉压下降
C. 脉压下降 D. 尿量减少 E. 有效循环血量锐减
22. 抗休克治疗的首选溶液是
A. 全血 B. 血浆 C. 平衡盐溶液 D. 左旋糖酐 E. 葡萄糖液
23. 休克的实质是
A. 血压下降 B. 中心静脉压下降 C. 脉压下降
D. 心指数下降 E. 微循环灌流不足
24. 关于休克护理下列哪项不妥
A. 平卧位 B. 常规吸氧
C. 给热水袋保暖 D. 观察尿量 E. 每 15 分钟测血压脉搏 1 次
25. 输液护理中判断血容量已补足的简便可靠依据是
A. 脉搏在 120 次/分以下 B. 收缩压在 90mmHg 以上
C. 中心静脉压在 $6\text{cmH}_2\text{O}$ 以上 D. 安静肢端温暖 E. 尿量 30ml/h 以上
26. 休克早期血压的变化特点是
A. 收缩压、舒张压均下降 B. 收缩压、舒张压均升高

- C. 收缩压、舒张压均无明显变化 D. 收缩压下降、舒张压正常
E 收缩压下降，舒张压升高
27. 由于大量失液而致休克的病人最为主要的护理诊断/护理问题是
A. 体液不足 B. 焦虑 C. 有感染的危险
D. 体液过多 E. 气体交换受损
28. 下列哪项是休克病人的危重征象
A. 收缩压低于 10.7kPa (80mmHg) B. 伴代谢性酸中毒
C. 脉搏细速 120 次/min D. 神志淡漠 E. 皮肤出现多数瘀点瘀斑
29. 男性病人，严重创伤后，血压降低，脉搏细速，面色苍白，诊断为休克。治疗时重点应注意
A. 急性肾功能衰竭的发生 B. 及时扩充血容量 C. 及时使用甘露醇
D. 避免使用血管收缩药 E. 药物对各脏器的毒性
30. 一休克病人进行扩容疗法快速输液时，监测得中心静脉压 15cmH₂O，血压 80/60mmHg，应采取的措施是
A. 大量输液加快速度 B. 控制速度，减慢输液 C. 减慢输液加用强心剂
D. 暂停输液 E. 用升压药
31. 冯先生因失血休克正在输液现测得其中心静脉压 5cmH₂O、BP80/55mmHg，应采取的措施是
A. 加快输液速度 B. 减慢输液速度
C. 应用强心药物 D. 应用去甲肾上腺素 E. 静脉滴注多巴胺
32. 病人烦躁不安，面色苍白，肢端湿冷，P100次/分，BP105/90mmHg，尿量20ml/h，在治疗时应首先静脉滴注
A. 血管扩张剂 B. 利尿剂 C. 5%碳酸氢钠溶液
D. 平衡盐溶液或生理盐水 E. 5%葡萄糖溶液

(33-34 题)

男性患者，因车祸发生脾破裂、失血性休克，准备手术。

33. 在等待配血期间，静脉输液宜首选
A. 5%葡萄糖液 B. 平衡盐溶液 C. 林格液
D. 5%碳酸氢钠 E. 5%葡萄糖等渗盐水
34. 在下列抗休克措施中，错误的是
A. 吸氧 B. 测中心静脉压 C. 测每小时尿量 D. 平卧位 E. 置热水袋加温

(35-36题)

男，25岁。半小时前左下腹部被撞伤，精神烦躁，面色苍白，呼吸浅促，腹部压痛明显，脉搏126次/分，血压82/60mmHg，尿量减少。

35. 目前病人最主要的护理诊断/医疗合作性问题是
A. 体液不足 B. 疼痛 C. 有受伤的危险
D. 有感染的危险 E. 气体交换受损
36. 对病人应首先采取的措施是
A. 迅速手术 B. 快速输液 C. 利尿

- D. 应用血管扩张剂 E. 纠正酸中毒

(37-39 题)

- A. 低血容量性休克 B. 感染性休克 C. 过敏性休克
D. 神经性休克 E. 创伤性休克
37. 全脊髓麻醉并发休克属于
38. 急性弥漫性腹膜炎并发休克属于
39. 脾破裂大出血可引起

第五章 麻醉病人的护理

1. 麻醉前禁食禁水最主要的目的是
- A. 便于术中操作 B. 防止术后便秘 C. 防止术后腹胀
D. 防止术后尿潴留 E. 预防术中、术后呕吐误吸
2. 利多卡因一次用量不宜超过
- A. 1000mg B. 800mg C. 400mg D. 100mg E. 60mg
3. 为了预防蛛网膜下腔麻醉(腰麻)后头痛,应采取的措施是
- A. 保持环境安静 B. 减少术中输液量 C. 垫枕平卧 4h
D. 去枕平卧 6h E. 做好麻醉前心理准备
4. 注射局麻药物后不久患者出现面色苍白、心悸气短、多语和烦躁不安等表现,首先应考虑其是否出现了
- A. 低血糖 B. 药物过敏 C. 排斥反应
D. 局部药毒性反应 E. 原有疾病病情变化
5. 舌后坠的表现是:
- A. 屏气 B. 呛咳 C. 吸气有鼾声 D. 鸡鸣音 E. 烦躁不安
6. 张某,男,50岁。在全麻下行胃大切。术后回病房麻醉还未清醒,患者血压,脉搏正常,呼吸困难,呼吸时喉头有啰音,应考虑:
- A. 舌后坠 B. 呼吸道分泌物过多 C. 喉痉挛
D. 呕吐物窒息 E. 呼吸节律紊乱
7. 一女患者,行腰麻术后 4h,烦躁不安,测血压、脉搏、呼吸均正常。查体见:下腹部膨隆,叩诊浊音。应首先考虑
- A 肠梗阻 B 急性胃扩张 C 腹腔内出血 D 急性腹膜炎 E 尿潴留

(8-10 题)

患者,女性,25岁,近1年来情绪急躁,月经不调,多食但消瘦,脉率>100次/分,入院准备行甲状腺大部分切除手术。

8. 对该病人首选的麻醉方式是
- A. 全身麻醉 B. 硬膜外麻醉
C. 区域阻滞麻醉 D. 颈丛神经阻滞 E. 臂丛神经阻滞
9. 该病人麻醉时前不能使用的药物是
- A. 安定 B. 阿托品
C. 阿托品 D. 氟哌啶 E. 苯巴比妥钠
10. 因为该药物的作用是

- A. 中枢性肌松
- B. 抗焦虑，抗惊厥
- C. 抗局麻药毒副反应
- D. 提高痛阈，减少麻醉药用量
- E. 抑制腺体分泌和迷走神经兴奋

(11-13 题)

- A. 表面麻醉
- B. 局部浸润麻醉
- C. 蛛网膜下腔阻滞麻醉
- D. 硬脊膜外腔阻滞麻醉
- E. 全身麻醉

- 11. 腹部以下手术选用
- 12. 一般上腹部手术选用
- 13. 应用最广泛的局麻

(14-16 题)

- A. 阿托品
- B. 吗啡
- C. 苯巴比妥钠
- D. 异丙嗪
- E. 布洛酚

- 14. 镇静，预防局麻药毒性反应的是：
- 15. 对呼吸中枢有抑制作用的是：
- 16. 减少呼吸道分泌，抑制迷走神经的是：

(17-18 题)

- A. 头痛
- B. 全脊髓麻醉
- C. 喉头痉挛
- D. 药物外渗组织坏死
- E. 局麻药中毒

- 17. 腰麻的并发症是
- 18. 硬膜外麻醉的严重并发症是

第六章 手术前后病人的护理

- 1. 在同一手术间，当日安排几种手术时，正确的顺序是
 - A. 特殊感染手术—一般感染手术—污染手术
 - B. 污染手术—一般感染手术—特殊感染手术
 - C. 一般感染手术—特殊感染手术—污染手术
 - D. 特殊感染手术—污染手术—一般感染手术
 - E. 污染手术—特殊感染手术—一般感染手术
- 2. 可用碘酊消毒的部位是：
 - A. 面部
 - B. 口腔
 - C. 尿道外口
 - D. 头部
 - E. 会阴部
- 3. 手术区皮肤的消毒范围，应包括切口周围 ___ 区域
 - A. 5cm
 - B. 10cm
 - C. 15cm
 - D. 20cm
 - E. 30cm
- 4. 一般择期手术病人的术前呼吸道准备措施是
 - A. 进行体位引流
 - B. 应用抗生素
 - C. 应用支气管扩张剂
 - D. 口服地塞米松
 - E. 禁烟
- 5. 手术前禁食的主要目的是
 - A. 方便手术操作
 - B. 防止麻醉中呕吐造成窒息
 - C. 避免术后腹痛腹胀
 - D. 防止术后吻合口瘘
 - E. 有利于肠蠕动恢复
- 6. 胃肠道手术前的准备下列哪项是错误的
 - A. 术前禁食 12h，禁水 4h
 - B. 术前 1 天可冲服番泻叶导泻

- C. 结肠手术前应行清洁灌肠 D. 幽门梗阻于术前 3 天每晚洗胃
E. 急症手术前需灌肠
7. 非急症手术麻醉前, 胃肠道准备要求:
A. 禁食 12h, 禁饮水 4-6h B. 禁食 6h, 禁饮水 2h
C. 禁食、禁水 4h D. 禁食 4h, 禁饮水 54h
E. 禁食、禁水 2h
8. 手术日晨的护理中哪项错误
A. 病人如感冒发热应延期手术 B. 将义齿固定, 防止脱落 C. 术前行药
D. 嘱病人排尿 E. 向手术室人员介绍病人
9. 手术前至少应在多长时间内避免吸烟:
A. 1 天 B. 3 天 C. 2 周 D. 3 周 E. 1 月
10. 上腹部手术备皮范围为:
A. 上起乳头连线, 两侧至腋中线下至耻骨联合及会阴部, 并剃除阴毛
B. 上起脐部, 两侧至腋中线下至耻骨联合及会阴部, 并剃除阴毛
C. 上起髂脊, 两侧至腋中线下至耻骨联合及会阴部, 并剃除阴毛
D. 上起乳头连线, 两侧至腋后线下至耻骨联合及会阴部, 并剃除阴毛
E. 上起髂脊, 两侧至腋后线下至耻骨联合及会阴部, 并剃除阴毛
11. 手术前病人最常见的护理诊断是
A. 体液不足 B. 营养失调 C. 体温过高
D. 焦虑或恐惧 E. 潜在并发症
12. 急性阑尾炎手术的备皮范围是
A. 上平乳头连线, 下至股部上 1/3 前、内侧, 两侧至腋后线
B. 上平剑突, 下至股部上 1/3 前、内侧, 两侧至腋后线
C. 上平剑突, 下至耻骨联合, 两侧至腋后线
D. 上平乳头连线, 下至耻骨联合, 两侧至腋后线
E. 上平脐, 下至股部上 1/3 前、内侧, 两侧至腋中线
- (13-15 题)
A 无菌手术 B 感染手术 C 污染手术 D 紧急手术 E 限期手术
13. 疝修补术是
14. 甲状腺大部切除术是
15. 胃肠道手术是
16. 急症手术的术前准备哪项除外
A. 密切观察并录病情变化 B. 通知病人禁饮、禁食
C. 迅速做好配血、备皮、药敏试验
D. 术前灌肠服泻药 E. 及时进行血、尿常规检查和出凝血时间的检查
17. 手术人员手臂消毒、穿无菌衣、戴无菌手套完毕, 其无菌的是
A. 肩以上 B. 腰以下 C. 背部 D. 双上肢及胸前 E. 腹股沟区以上
18. 手术中如手套破损或触及到有菌区时应
A. 重新洗手 B. 酒精消毒 C. 更换手套 D. 加戴手套 E. 退出手术
19. 下列有关肥皂刷手法步骤的描述, 正确的是

- A. 浸泡在乙醇桶内的时间为 5 分钟 B. 冲水时应将手指及肘均朝下，以利于冲净
C. 浸泡 75%乙醇范围应到肘上 3cm D. 范围应从手指尖到肘上 5cm
E. 浸泡乙醇后应擦干手臂
20. 导致手术野污染的途径，应除外哪项
A. 手术器械用品 B. 麻醉器械 C. 手术人员的手臂
D. 病人手术区皮肤 E. 感染病灶或空腔脏器内容物
21. 手术过程中，清点核对器械、敷料的时间是
A. 手术开始前和准备关体腔前 B. 手术进行中
C. 手术开始前 D. 开始缝合皮肤前 E. 手术完毕后
22. 手术护士与巡回护士应共同完成的工作为
A. 术中观察病情 B. 传递器械 C. 安置手术体位
D. 体腔切开与关闭之前清点器械敷料 E. 术后清洗器械
23. 下列哪项不是巡回护士的职责
A. 安置手术体位 B. 参与清点器械、纱布 C. 监督无菌操作
D. 整理无菌器械台 E. 做好手术前环境准备
24. 下列操作不符合无菌原则的是
A. 术者双手保持在无菌台面以上 B. 术者面对面更换位置
C. 术者肘部接触有菌区后带袖套
D. 手术区无菌巾浸润后立即加盖无菌巾
E. 胃肠切开前垫好纱垫
25. 手术人员在手术前正确的操作是
A. 用口罩遮住口唇，鼻外露 B. 刷手后冲洗时手指朝下
C. 从手指向上刷到平肘关节处 D. 刷手后无菌毛巾要来回控拭手臂
E. 感染手术后必须重新刷手才能进行下一台手术
26. 手术人员无菌技术不正确的是
A. 帽子必须完全盖住头发 B. 先穿无菌手术衣再戴无菌手套
C. 每桶苯扎溴铵溶液最多可供 40 人次泡手
D. 戴无菌手套时，已消毒手指不能接触手套背侧部
E. 肘部触及有菌物后可继续手术，但应注意该处不再接触无菌区
27. 手术过程中，不慎被缝针刺破手套后应
A. 用 3%碘酊擦拭 B. 用 3%碘酊擦拭后更换手套
C. 更换手套及袖套 D. 更换手套及手术衣 E. 重新洗手更换手套
28. 带无菌手套时允许已消毒手指接触手套的
A. 手背部位 B. 手套掌心部位 C. 手套口翻转部位内面
D. 手套口翻转部位外面 E. 手套的外面
29. 绿脓杆菌感染手术后，手术室消毒正确的是
A. 先用乳酸行空气消毒，后用 0.1%苯扎溴铵液擦洗室内物品
B. 先用 0.1%苯扎溴铵液擦洗室内物品，后用乳酸行空气消毒
C. 用紫外线灯照射 2h D. 40 甲醛% + 高锰酸钾熏蒸
E. 用过氧乙酸熏蒸消毒后. 封闭 4h

30. 手术人员洗手前, 不正规的准备项目是
A 更换手术室专用衣裤鞋帽 B 口罩必须把口鼻盖严 C 帽子必须完全盖住头发
D 修剪指甲并挫平甲缘 E 袖口要卷到肘部
- 一女性病人, 36岁, 以右侧乳腺肿块个月入院。当确诊为右侧乳腺癌需手术治疗时, 表现为紧张不安、抑郁、失眠、情绪低落。与其交谈得知, 病人担心治疗效果、预后、家庭生活及工作等。
- 31 该病人目前的护理诊断/护理问题是
A 绝望 B 睡眠紊乱 C 焦虑 D 恐惧 E 营养失调
- 32 对该病人目前宜采取的护理措施是
A 教育、安慰 B 同情、体贴 C 应用镇静剂
D 经常巡视 E 早期下床活动
- 33 手术后配合化疗, 化疗前护理评估中没有重要意义的是
A 白细胞计数 B 血小板计数 C 肾功能测定 D 血脂测定 E 免疫功能
- 34 在病人化疗期间, 不正确的护理措施是
A 每周监测白细胞 1-2 次 B 检查口腔黏膜有无炎症
C 穿刺静脉有条索和压痛时按摩治疗 D 观察有无感染征象
E 观察有无消化道反应
- (35-36 题)
- A. 平卧 4-6h B. 颈仰卧位 C. 膀胱截石位 D. 头高斜坡位
E. 去枕平卧, 头偏向一侧
35. 甲状腺次全切除术应取:
36. 膀胱镜检查应取:
37. 下列哪项不是手术后切口感染的表现
A. 术后 24h 内切口剧烈疼痛 B. 术后 3 日切口处疼痛剧烈
C. 术后 3 日体温上升至 38℃ 以上
D. 切口红肿热痛 E. 术后白血球总数持续上升
38. 全麻术后未清醒的病人, 最适宜的体位是:
A. 仰卧位 B. 平卧位, 头偏向一侧 C. 头低足高 D. 侧卧位 E. 半坐卧位
39. 胃肠道手术后, 病人开始进流食的时间是
A. 腹痛消失后 B. 病人有食欲 C. 肛门排气后
D. 恶心呕吐消失后 E. 拆线后
40. 手术后早期活动的主要意义为
A. 防止心力衰竭 B. 防止肺部并发症
C. 防止切口裂开 D. 防止压疮发生 E. 防止伤口感染
41. 术后恶心、呕吐的最常见原因是
A 伤口疼痛 B 腹胀 C 肠炎 D 麻醉反应 E 肠蠕动增强
42. 下列哪项不是手术后并发症
A 出血 B 伤口疼痛 C 切口感染和裂开
D 肺不张和肺炎 E 血栓性静脉炎

43. 腹部的缝合伤口，出现红肿、压痛、有波动，最主要的处理是
A 拆除缝线，引流 B 应用抗生素 C 局部热敷 D 半卧位 E 局部理疗
44. 术后切口裂开，其处理下列哪项不妥
A 安慰患者 B 立即将内脏还纳 C 立即用灭菌盐水纱布覆盖
D 用腹带包扎 E 送手术室缝合
45. 观察危重病人生命体征的间隔时间一般是
A. 5-10min B. 15-30min C. 30-60min D. 1-2h E. 2-4h
46. 下列不属于手术后常见并发症的是：
A. 术后出血 B. 切口感染与裂开 C. 尿路感染与肺不张
D. 肠梗阻 E. 深静脉血栓形成
47. 术后早期离床活动的目的不包括
A 减少肺部并发症 B 促进伤口愈合 C 促进胃肠道功能恢复
D 促进排尿功能恢复 E 减轻切口疼痛
48. 腰麻后病人去枕平卧 6-8h 主要是预防
A. 低血压 B. 呕吐 C. 切口疼痛 D. 头痛 E 切口裂开
49. 男性，45 岁，术后体温升至 38℃，2 天后恢复正常，最可能的原因是
A. 切口感染 B. 肺部感染 C. 泌尿系感染 D. 血栓性静脉炎 E. 手术热
50. 孙先生，41 岁，有吸烟史 20 年。全麻行腹腔镜胆囊切除术后，已拔除气管插管，病人意识模糊。目前最重要的护理是
A. 保持呼吸道通畅 B. 约束肢体活动 C. 防止输液针头脱出
D. 监测生命体征 E. 做好保暖
51. 女，52 岁。阑尾切除术后第 3 天，诉创口剧痛难忍，测体温 38℃，脉搏 92 次/分，白细胞增高，首先考虑的是
A. 肺不张 B. 尿路感染
C. 切口感染 D. 上呼吸道感染 E. 外科热

(52-53 题)

张某，男，50 岁，在全麻下行胃大部切除术，术后回病房麻醉未清醒。

52. 病人血压、脉搏正常，呼吸困难，呼吸时喉头有啰音，应考虑
A. 舌后坠 B. 呼吸道分泌物过多 C. 喉痉挛
D. 呕吐物窒息 E. 呼吸节律紊乱
53. 该病人回病房后应取的体位是
A 仰卧位 B. 去枕平卧，头偏向一侧 C. 半卧位
D. 头高卧位 E. 俯卧位

(54-55 题)

- A. 去枕平卧，头侧向一侧 B. 侧卧位 C. 半卧位
D. 去枕平卧 6-8h E. 头高斜坡位
54. 胃大部切除术后应选择
55. 颅脑手术后应选择

(56-57 题)

- A. 术后即可进食 B. 3-4h 后 C. 24h 后
D. 肛门排气后 E. 麻醉清醒后
56. 胃肠道手术后进食时机是
57. 局麻下乳腺纤维瘤摘除术后进食时机是
(58-61 题)
- A. 去枕平卧位 B. 15°-30° 头高脚低斜坡卧位 C. 俯卧位
D. 半坐卧位 E. 平卧位
58. 麻醉解除、血压平稳后，颈、胸、腹部手术病人一般应取
59. 颅脑手术后无昏迷休克的病人应采取
60. 腰麻术后应采取
61. 硬膜外麻醉后应采取

第七章 外科感染病人的护理

1. 需及早切开引流的急性软组织感染是：
A. 急性淋巴管炎 B. 急性淋巴结炎 C. 疖 D. 颌下蜂窝织炎 E. 疔
2. 面部“危险三角区”疔最危险的并发症是
A. 眼球感染 B. 毒血症 C. 面部蜂窝织炎
D. 化脓性海绵状静脉窦炎 E. 窒息
3. 急性化脓性感染在出现波动前需早期切开引流的是
A 疔 B. 疖 C. 脓性指头炎 D. 急性淋巴管炎
E. 脓血症转移性脓肿
4. 阑尾炎手术后切口感染，脓液粘稠呈灰白色，其致病菌是
A. 大肠埃希菌（大肠杆菌） B. 金黄色葡萄球菌 C. 溶血性链球菌
D. 铜绿假单胞菌（绿脓杆菌） E. 无芽胞性厌氧菌
5. 属于特异性感染的是
A. 丹毒 B. 淋巴结炎 C. 破伤风 D. 疖 E. 急性蜂窝织炎
6. 在伤口的近侧出现“红线”，硬而有压痛，通常是
A. 网状淋巴管炎 B. 浅表静脉炎 C. 浅表淋巴管炎 D. 深部淋巴管炎
E. 急性疏松结缔组织炎
7. 病人血液中既有细菌生长又有细菌毒素的是
A. 毒血症 B. 菌血症 C. 败血症 D. 脓血症 E. 一般感染
8. 脓性指头炎如不及时治疗，容易引起
A. 甲沟炎 B. 指甲下脓肿 C. 化脓性腱鞘炎
D. 指骨缺血性坏死 E. 指甲周围炎
9. 脓肿形成后最佳的治疗措施是
A. 应用足量有效的抗生素 B. 穿刺抽脓并注入抗生素 C. 外用消炎药膏
D. 脓肿切开引流 E. 局部热敷促进吸收
10. 预防外科感染不正确的是
A. 增强机体抵抗力 B. 经常服用抗生素

- C. 严格无菌操作 D. 及时正确的处理伤口 E. 外伤后及时就诊
11. 下列关于外科感染的特点说法正确的是：
A. 多数为几种细菌引起的混合感染
B. 少数在感染早期为单一细菌所致，以后发展为几种细菌引起的混合感染
C. 大部分有明显而突出的局部症状和体征
D. 感染常集中在局部，发展后会导致化脓、坏死等
E. 以上均是
12. 发生在特殊部位如：口底、颌下的蜂窝织炎最重要的观察内容：
A. 注意观察呼吸，防止窒息的发生 B. 观察血压的变化，防止低血压的发生
C. 观察体温变化，防止体温过高或过低 D. 观察神志，防止意识的改变
E. 观察输液量，防止休克的发生
13. 面部“危险三角区”疔的危险性在于
A. 引起眼球后感染 B. 抗生素治疗无效
C. 可并发上颌窦炎 D. 容易形成痈 E. 引起海绵状静脉窦炎
14. 为提高脓毒症病人血细菌培养阳性率，采血时间应选择在
A. 高热、寒战时 B. 高热、寒战后 C. 输注抗生素时
D. 输注抗生素后 E. 任何时段
15. 厌氧菌感染的脓液特点是
A. 脓液稠厚、黄色无臭 B. 稀薄、淡红色 C. 绿色有霉腥味
D. 灰白、无臭 E. 有特殊恶臭
16. 全身化脓性感染出现转移性脓肿的是
A. 败血症 B. 菌血症 C. 毒血症 D. 脓血症 E. 以上都不是
17. 深部脓肿最重要的依据是
A. 高热、白细胞升高 B. 局部水肿明显
C. 穿刺抽出脓液 D. 波动感明显 E. 局部深压痛
18. 急性蜂窝织炎的描述，错误的是
A. 是指皮下筋膜下肌间隙或深部蜂窝组织的急性化脓性感染
B. 致病菌以溶血性链球菌最常见
C. 浅表的急性蜂窝织炎无明显边界
D. 口底颌下蜂窝织炎未抽出脓液，严禁切开
E. 新生儿皮下坏疽属于特殊类型的蜂窝织炎
19. 男，35岁，上唇疔肿挤压后局部红肿，头痛，寒战，高热，呕吐，最后出现昏迷，应考虑为
A. 败血症 B. 毒血症 C. 脓血症 D. 上唇蜂窝组织炎 E. 颅内海绵窦静脉炎
20. 不需手术切开引流的外科感染是
A. 丹毒 B. 新生儿皮下坏疽 C. 急性蜂窝组织炎 D. 背痈 E. 脓肿
- (21-22 题)
- A. 疔 B. 痈 C. 破伤风 D. 丹毒 E. 急性蜂窝织炎
21. 属于特异性感染的是
22. 不易发生化脓的是

(23-26 题)

- A. 丹毒 B. 疔 C. 淋巴管炎 D. 疖 E. 急性蜂窝织炎
23. 是单个毛囊及其所属皮脂腺的急性化脓性感染
24. 是多个相邻毛囊及其所属皮脂腺或汗腺的急性化脓性感染
25. 是皮下或深部疏松结缔组织的急性化脓性炎症
26. 是皮内淋巴网的急性感染:

(27-28 题)

- A. 稠厚, 黄色、不臭 B. 稀薄, 淡红色、量多 C. 稠厚, 有粪臭
- D. 淡绿色, 有特殊腥臭味 E. 稀薄, 米汤样
27. 大肠埃希菌感染脓液的特点是
28. 铜绿假单胞菌感染脓液的特点是

(29-31题)

- A. 溶血性链球菌 B. 金黄色葡萄球菌 C. 破伤风杆菌
- D. 大肠杆菌 E. 梭状芽孢杆菌
29. 丹毒的主要致病菌是
30. 疔的主要致病菌是
31. 破伤风的致病菌是
32. 破伤风最早发生强直性痉挛的肌群是
- A. 面肌 B. 咀嚼肌(咬肌) C. 颈项肌 D. 背腹肌 E. 膈肌
33. 破伤风是由破伤风杆菌引起的
- A. 败血症 B. 菌血症 C. 毒血症 D. 脓血症 E. 局部感染
34. 对破伤风病人护理的一般要求下列正确的是:
- A. 严格隔离 B. 病室阳光充足 C. 伤口敷料用后高压灭菌
- D. 各种护理不要集中处理, 以免加重刺激
- E. 治疗护理操作应在使用镇静剂前 30 分钟内进行
35. 肢体外伤后预防破伤风最有效的方法是
- A. 注射抗生素 B. 注射破伤风抗毒素
- C. 注射破伤风类毒素 D. 彻底清创, 注射破伤风抗毒素
- E. 注射破伤风免疫球蛋白
36. 应用破伤风抗毒素的目的是
- A. 杀死破伤风杆菌 B. 中和血液中游离毒素
- C. 抑制破伤风杆菌生长 D. 中和与神经结合的毒素 E. 消除毒素来源
37. 预防破伤风最可靠也是最经济的方法是
- A. 注射青霉素 B. 注射破伤风抗毒素 C. 注射人体破伤风免疫球蛋白
- D. 注射破伤风类毒素 E. 彻底清创
38. 破伤风的实质是
- A. 菌血症 B. 毒血症 C. 败血症 D. 脓血症 E. 脓毒败血症
39. 破伤风病人致死的主要原因是
- A. 脱水 B. 代谢性酸中毒 C. 肺炎、肺不张

- D. 呼吸困难、窒息 E 代谢性硷中毒
40. 破伤风最先出现的症状是
A. 苦笑面容 B. 颈项强直 C. 张口困难 D. 角弓反张 E. 手足抽搐
41. 男性，20岁，破伤风患者，抽搐频繁，引起肘关节脱臼，呼吸道分泌物多，有窒息可能，此时，应首先处理的是
A. 气管切开 B. 脱臼复位 C. 静脉点滴破伤风抗毒素
D. 鼻饲流质 E. 输液，应用青霉素
42. 崔女士，26岁，破伤风患者，抽搐时引起呼吸困难，窒息，该患者急救应首先
A. 给予氧气吸入 B. 气管插管 C. 气管切开
D. 呼吸兴奋剂 E. 立即进手术室
43. 季先生，因足部外伤致破伤风，频发全身肌肉抽搐，呼吸困难，发绀。最重要的护理措施是
A. 保持呼吸道通畅 B. 应用破伤风抗毒素
C. 保持环境安静 D. 避免损伤 E. 预防感染

(44-45题)

杨某，男，46岁，因足底刺伤后出现全身肌肉强直性收缩，阵发性痉挛，诊断为破伤风。

44. 易导致病人死亡的常见原因是
A. 休克 B. 窒息 C. 肺部感染 D. 心脏损害 E. 脱水、酸中毒
45. 下列护理措施与控制痉挛无关的是
A. 保持病室安静 B. 护理措施要集中进行 C. 按时使用镇静剂
D. 鼻饲流质饮食 E. 避免强光照射
46. 预防创伤后发生气性坏疽最可靠的方法是
A. 彻底清创 B. 使用大剂量抗生素 C. 高压氧治疗
D. 纠正电解质紊乱 E. 及时给予气性坏疽抗毒血清

(47-49题)

患者，男，35岁，开放性骨折合并大腿、臀部肌肉广泛损伤后，诉伤肢胀裂样疼痛，止痛剂不能奏效，移除敷料可见有气泡从伤口冒出。

47. 该患者首先考虑为
A. 骨折合并脓血症 B. 骨折合并毒血症 C. 骨髓炎
D. 骨折合并气性坏疽 E. 以上都不对
48. 该患者的创口处理不包括
A. 清创范围达正常肌组织 B. 清创后予以缝合
C. 术后用3%过氧化氢冲洗 D. 术后用1:1000高锰酸钾溶液冲洗
E. 清创要彻底
49. 对患者的护理评估哪项是错误的
A 评估伤肢感觉、疼痛性质、程度 B 评估伤口有无水泡、气泡溢出
C 评估分泌物的性状、颜色及气味 D 无须评估患者的意识形态、皮肤黏膜色泽及温度
E 评估止痛剂的效果

第八章 损伤病人的护理

- 下列哪一种为闭合性损伤
A. 擦伤 B. 刺伤 C. 挫伤 D. 切割伤 E. 裂伤
 - 属于开放性损伤的是
A. 扭伤 B. 爆震伤 C. 挤压伤 D. 挫伤 E. 擦伤
 - 按急救顺序对机械性损伤患者最先采用的措施是：
A. 重点检查 B. 抢救生命 C. 包扎伤口
D. 输血、止血 E. 固定和搬运
 - 容易引起急性肾衰竭的损伤是
A. 严重裂伤 B. 严重切割伤 C. 严重挤压伤
D. 严重撕脱伤 E. 严重扭伤
 - 肢体损伤使用止血带时，应每隔1h放松一次，每次放松
A. 1-2min B. 2-3min C. 3-4min D. 4-5min E. 5-6min
 - 外伤后施行清创术的最佳时机是
A. 6-8h内 B. 8-12h内
C. 10-12h内 C. 12-16h内 E. 16-18h内
 - 开放性骨折伴动脉破裂出血且合并休克的病人，现场急救应首先
A. 固定骨折 B. 止痛 C. 止血 D. 输液 E. 包扎伤口
 - 损伤常用的分类方法包括：
A. 以致伤原因 B. 按受伤部位 C. 按皮肤完整性
D. 按受伤程度 E. 以上均是
 - 应首先给予现场抢救的伤员是
A. 脑挫伤 B. 张力性气胸 C. 小腿挫裂伤
D. 肠穿孔 E. 上肢开放性骨折
 - 在特大事故中，现场应首先抢救的伤员是
A. 腰椎骨折合并截瘫 B. 肱骨干骨折 C. 腹部开放伤肠管脱出
D. 动脉破裂大出血 E. 头部开放伤及昏迷
 - I期愈合是指
A 伤口无感染的愈合 B 伤口无瘢痕的愈合 C 所有无菌切口的愈合
D 虽无感染但是延期的愈合 E 无感染且呈线状瘢痕的愈合
 - 杨某，男，25岁，因车祸造成多发性创伤，急救时发现室息，腹部有内脏脱出，股骨开放性骨折，病人血压低，脉微速。首先要处理的情况是
A. 室息 B. 腹部外伤 C. 股骨开放性骨折 D. 休克 E. 脉搏微弱
- (13-15题)
- 挫伤 B. 扭伤 C. 挤压伤 D. 裂伤 E. 刺伤
 - 易发生坏死和感染的损伤是
 - 容易引起破伤风的损伤是
 - 容易引起急性肾衰竭的损伤是
 - 烧伤暴露疗法的护理措施，哪项描述不正确：

- A. 保持室温 28℃，相对湿度 50% B. 痂面涂碘伏以预防感染
C. 及时更换无菌垫单 D. 使创面直接暴露在空气中
E. 减少翻身以保护创面
17. 深Ⅱ°烧伤的特点
A. 创面红肿 B. 有水疱，剧痛 C. 感觉过敏，疱底部水肿、鲜红
D. 感觉迟钝，疱底部苍白、潮湿，痛觉尚存
E. 创面皮革样苍白，感觉消失，痛觉消失
18. 大面积烧伤后休克期液体渗出最快是伤后
A. 6-8h B. 8-24h C. 24-36h D. 36-48h E. 48-72h
19. 烧伤创面包扎疗法，应立即改为暴露疗法的情况是：
A. 敷料湿透 B. 病人发热 C. 创面疼痛
D. 敷料颜色呈现绿色 E. 血液检查白细胞增高
20. 大面积烧伤病人补液，应在第一个 8h 内快速输入总量的 1/2，是因为
A. 疼痛剧烈 B. 毛细血管扩张 C. 尿量过多
D. 促进毒素排出 E. 创面渗出最快
21. 大面积烧伤急救中，若病人口渴应给予
A. 热开水 B. 糖开水 C. 淡盐水 D. 纯净水 E. 凉茶水
22. 判断烧伤严重程度的主要依据是
A. 烧伤部位 B. 年龄 C. 健康情况
D. 烧伤面积及深度 E. 致伤因素
23. 大面积烧伤病人补液时，调节补液量及补液速度最简便可靠的观察指标是
A. 血压 B. 脉搏 C. 中心静脉压 D. 尿量 E. 体温
24. 头面部烧伤急救时应特别注意
A 保持呼吸道通畅 B 包敷创面，避免污染 C 预防休克 D 及时清创
E 早用 TAT，预防破伤风
25. 烧伤病人伤后 48h 内，最大的危险是：
A. 感染 B. 低血容量性休克 C. 疼痛 D. 出血 E. 恐惧
26. 烧伤病人采取暴露疗法，适用于：
A. 头面部烧伤 B. 颈部烧伤 C. 会阴部烧伤
D. 面部烧伤 E. 以上均是
27. 浅Ⅱ°烧伤创面特点
A. 水泡基底苍白 B. 剧痛. 水泡基底鲜红
C. 皮肤干燥. 红斑 D. 创面焦黄无弹性 E. 树枝状栓塞血管
28. 烧伤休克期是伤后
A. 8-12h 以内 B. 12-24 内 C. 24-48h 内 D. 48-72h 内 E. 72h 以上
29. 烧伤后患者出现休克症状时，最早的治疗措施中，下列哪项是错误的
A. 立即转往有条件的医院治疗 B. 镇静止痛 C. 立即静脉输液
D. 保护创面，防止再损伤 E. 注意合并伤的诊断及处理
30. 关于深Ⅱ度烧伤描述不正确的是

- A. 伤及真皮层 B. 创面有水泡，基底湿润，苍白
C. 创面疼痛剧烈 D. 3-5周愈合 E. 愈合后多留有瘢痕
31. 体重 60kg 成年人，烫伤双上肢、躯干及双侧臀部，均为 II°，急诊入院，其第一个 24h 补液总量应该是
A. 3000-4500ml B. 5000-6000ml C. 6500-7500ml
D. 8000-9000ml E. 9000-10000ml
32. 男，38 岁。双手和右膝关节以下被开水烫伤，创面明显水肿，剧烈疼痛，局部有大小不等的水疱。其烧伤面积和深度是：
A. 12%浅 II 度 B. 12%深 II 度 C. 15%浅 II 度
D. 15%深 II 度 E. 25%浅 II 度
33. 女性，20 岁左足被开水烫伤，疼痛剧烈，局部有水疱，其烧伤面积及深度为：
A. 3.5%，I B. 3.5%，浅 II C. 4%，深 II
D. 7%，浅 II E. 3%，I
34. 女性，34 岁。以大面积烧伤入院，检查发现其双足、右下肢、右手和右前臂二度烧伤。其烧伤面积应为
A. 29% B. 32% C. 35% D. 41% E. 45%
35. 男性，36 岁，大面积烧伤 8h，已静脉输液 3000ml，判断其血容量是否补足的简便、可靠指标是
A. 脉搏 B. 血压 C. 呼吸 D. 尿量 E. 中心静脉压
36. 女性，30 岁。体重 50 公斤，烧伤面积为 80%，烧伤部位剧痛，有水疱，部分基底苍白，第一个 24h 应补液总量为
A 3000ml B 5000ml C 6000ml D 8000ml E 9000ml
37. 7 岁小儿双下肢（包括臀部）和左上肢被烧伤，其面积是
A. 55% B. 50% C. 46% D. 41% E. 35%
38. 男性，20 岁，面部、右手、右前臂烧伤，有水疱，剧痛，估计该患者烧伤总面积和深度为
A. 8%深 II 度 B. 5%浅 II 度 C. 9%深 II 度 D. 9%浅 II 度 E. 5%深 II 度

(39-40 题)

男性，35 岁，体重 70kg，烧伤后 4h 送至医院。右上肢水肿明显，剧烈疼痛，有较大水疱；双下肢（不包括臀部）无水疱，皮肤焦黄色，触之不痛，如皮革样。

39. 该病人的烧伤深度为
A 右上肢浅二度烧伤，双下肢三度烧伤 B 右上肢深二度烧伤，双下肢三度烧伤
C 右上肢浅二度烧伤，双下肢深二度烧伤 D 右上肢与双下肢均为深二度烧伤
E 右上肢与双下肢均为三度烧伤
40. 烧伤后第一个 24h 的补液总量大约是
A. 4500ml B. 5250ml C. 6250ml D. 7250ml E. 7500ml

(41-42 题)

男，30 岁，体重 60kg 烧开水时不慎烫伤右上肢，双下肢不包括臀部，大水疱，部分皮肤脱落，创面渗出。

41. 该病人烧伤面积为

- A. 30% B. 40% C. 59% D. 63% E. 68%

42. 该病人烧伤深度为

- A. I 度烧伤 B. 浅 II 度烧伤 C. 深 II 度烧伤 D. III 度烧伤 E. 重度烧伤
(43-46 题)

一健康成年人，体重为 60kg，不慎被烧伤，烧伤情况为：左前臂和面部是红斑状，表面干燥无水肿，感觉过敏；左上臂和右大腿可见大量不等的水疱，基底潮红，水肿明显，剧痛，右前臂、右上臂和左大腿可见少量较小的水疱，基底红白相间，渗出较多，肿胀明显，有拔毛痛，双手和双足呈苍白色，可见树枝状静脉栓塞网。请问：

43. I 度面积为多少？

- A. 2% B. 4% C. 6% D. 8% E. 10%

44. 浅 II 度面积为多少？

- A. 12% B. 14% C. 16% D. 18% E. 20%

45. 深 II 度面积为多少？

- A. 17% B. 17% C. 17% D. 17% E. 17%

46. 烧伤总面积及严重程度。

- A. 43%，重度 B. 35%，轻度 C. 30%，重度
D. 26%，重度 E. 37%，重度

(47-50 题)

一体重 60kg，II 度烧伤，烧伤面积为 50% 的患者，请问

47. 第一个 24h 液体总量大约为多少？

- A. 2500ml B. 3000ml C. 4500ml D. 5300ml E. 6500ml

48. 适宜的疗法是？

- A. 暴露疗法 B. 包扎疗法 C. 浸润疗法 D. 药物湿敷 E. 烤灯烘烤

49. 补液时，调节补液量及补液速度最简便、可靠的观察指标是：

- A. 血压 B. 脉搏 C. 中心静脉压 D. 尿量 E. 体温

50. 烧伤的严重程度？

- A. 轻度 B. 中度 C. 重度 D. 特重度 E. 危重

(51-54 题)

病例：患儿，2 岁，体重 15kg，在家玩耍时不慎打翻开水瓶，双下肢被开水烫伤后皮肤出现大水疱，皮薄，疼痛明显，水疱破裂后创面为红色。

51. 该患儿的烧伤面积为

- A. 10% B. 26% C. 36% D. 50% E. 70%

52. 烧伤深度为

- A. I° B. 浅 II° C. 深 II° D. III° E. IV°

53. 对于该患儿，不正确的急救措施是

- A. 迅速脱离热源 B. 创面涂抹龙胆紫 C. 用大量自来水冲洗双下肢
D. 大量补液 E. 迅速送往医院

54. 该患儿烧伤后第一个 24h 应补的晶体和胶体液总量是

- A. 972ml B. 1080ml C. 2312ml D. 3680ml E. 3860ml

(55—56 题)

- A. 剧痛、感觉过敏 B. 烧灼感刺痛 C. 痛觉迟钝

- D. 痛觉消失 E. 红、肿和刺痛
55. 浅 II 度烧伤
56. 深 II 度烧伤
57. 下列缝合伤口拆线时间不正确的是
- A. 头面颈部手术 4-5 天 B. 四肢手术 10-12 天 C. 腹部 5-6 天
- D. 减张缝合一般 14 天 E. 年老体弱营养差可适当推迟
58. 先给换药的病人是:
- A. 甲状腺切除术后 B. 破伤风感染伤口 C. “T” 型管引流
- D. 蜂窝织炎 E. 胃大部切除术后
59. 适用于肉芽水肿创面湿敷的溶液是
- A 0.01%-0.05%苯扎溴铵溶液 B 碘伏 C 3%-5%氯化钠
- D 0.02%-0.05%氯己定 E 0.01%-0.02%高锰酸钾
- (60-61 题)
- A 3-5 天 B 5-7 天 C 7-10 天 D 10-12 天 E 14 天
60. 面部切口拆线时间是
61. 四肢部位切口拆线时间为

第九章 肿瘤病人的护理

1. 可作为肿瘤定性诊断的检查是
- A. CT B. B 超 C. X 线造影 D. MRI E. 病理检查
2. 当前对多数肿瘤早期最好的治疗方法是
- A. 手术疗法 B. 放射疗法 C. 化学药物疗法
- D. 中医中药疗法 E. 免疫疗法
3. 恶性肿瘤的特点, 正确的是
- A. 膨胀性生长, 有包膜 B. 境界不清、固定, 质硬
- C. 生长慢 D. 细胞分化程度高 E. 不会形成溃疡
4. 诊断恶性肿瘤最可靠的依据是:
- A. 实验室检查 B. B 超检查 C. 放射性核素检查
- D. 病理检查 E. X 线造影
5. 恶性肿瘤中癌是来自于
- A. 上皮组织 B. 间叶组织 C. 胚胎组织 D. 肌肉组织 E. 淋巴组织
6. 关于肿瘤化疗的护理, 下列不正确的是
- A. 药液必须现用现配制 B. 药物应在规定的时间内用完
- C. 若出现药液外渗应立即热敷 D. 抽吸化疗药物的注射器和空药瓶应单独处理
- E. 每周检查白细胞和血小板计数
7. 下列对放疗病人的健康教育不正确的是
- A. 告知穿着宽松、柔软、吸湿性强的内衣 B. 告知皮肤瘙痒时勿用手搔抓
- C. 告知保持局部清洁干燥 D. 告知放疗后多喝水, 卧床休息至少 30 分钟
- E. 告知每天用肥皂清洗皮肤

8. 良性肿瘤不具备以下哪些性质
A. 生长速度较慢 B. 多有完整包膜
C. 多呈浸润性生长 D. 无转移 E. 一般不危及病人生命
9. 以下哪项不是恶性肿瘤的晚期表现
A. 消瘦 B. 乏力 C. 食欲亢进 D. 贫血 E. 发热
10. 恶性肿瘤的 TNM 分期法中的 M 表示
A 预后情况 B 淋巴结 C 恶性程度 D 原发肿瘤 E 远处转移
11. 在肿瘤病人化疗或放疗期间, 最主要的观察项目是
A 脱发程度 B 食欲 C 恶心、呕吐 D 皮肤损害 E 白细胞和血小板计数
12. 肿瘤放疗易损伤皮肤, 护理时应:
A. 保持皮肤干燥, 清洁 B. 肥皂水清洗 C. 热敷理疗
D. 外用药物 E. 按摩
13. 下列哪项不符合良性肿瘤的特征
A. 生长缓慢 B 膨胀性生长 C 常伴有溃疡 D 不发生转移 E 边界清楚
- 14 放疗局部皮肤出现干反应时, 宜涂抹
A 0.2%薄荷淀粉 B 2%甲紫溶液 C 2%碘酊 D 硼酸软膏 E 酒精
15. 李某, 女, 38 岁, 急性粒细胞白血病, 行静脉注射化疗药物后, 立即出现注射部位疼痛, 肿胀。护士应考虑为
A 化疗药物反应 B 化疗药物露出血管外 C 高渗性药液刺激血管壁所致
D 化疗药物过敏 E 血栓性静脉炎

第十章 颅脑外科疾病病人的护理

1. 颅内压增高的三主征是
A. 头痛、呕吐、颈项强直 B. 头痛、呕吐、抽搐发作
C. 头痛、呕吐、视神经乳头水肿 D. 头痛、呕吐、肢体偏瘫
E. 头痛、颈项强直、肢体偏瘫
2. 脑挫裂伤的临床表现哪项描述错误
A. 昏迷超过 30 min B. 生命体征明显改变 C. 可出现血性脑脊液
D. 局灶体征大多阴性 E. 重者可长期持续昏迷
3. 颅盖骨折呈“乒乓球样”凹陷的常见人群是
A. 婴幼儿 B. 青少年 C. 中年 D. 壮年 E. 老年人
4. 诊断脑震荡的主要依据是 C
A. 头皮擦伤痕 B. 颅骨骨折 C. 短暂昏迷和逆行性遗忘
D. 头晕、头痛、呕吐 E. 生命体征改变
5. 颅底骨折伴脑脊液漏的护理错误的是
A. 抬高床头 B. 鼻前庭或外耳道口放一干棉球 C. 记 24h 漏液量
D. 耳、鼻冲洗或滴药 E. 不考虑立即手术治疗
6. 颅脑损伤病人护理重点应放在
A. 配合抢救 B. 预防感染 C. 心理护理

- D. 观察和协助处理并发症 E. 生活护理
7. 颅前窝骨折易损伤的神经是
A. 嗅神经 B. 展神经 C. 听神经 D. 面神经 E. 滑车神经
8. 急性硬脑膜外血肿意识障碍的典型特点
A. 原发性昏迷 B. 继发性昏迷 C. 中间清醒期 D. 持续性昏迷 E. 浅昏迷
9. 重症颅脑损伤患者如果没有休克，应采取哪种卧位
A. 头高卧位，将床头抬高 30-45cm B. 头高卧位，将床头抬高 15°-30°
C. 平卧 D. 仰卧 E. 头低脚高位
10. 急性颅内压增高患者典型的生命体征表现是
A. 心率快，呼吸急促 B. 心率快，血压降低 C. 心率快，血压高
D. 心率、呼吸慢，血压高 E. 心率慢，血压低
11. 通过改善毛细血管通透性降低颅内压的治疗方法是
A. 脱水治疗 B. 过度换气 C. 激素治疗
D. 冬眠低温治疗 E. 脑室穿刺外引流术
12. 某患者，男，25岁，因被人砍伤头部致头皮裂伤大出血，现场处理该患者应首先
A. 立即拨打 120 求救 B. 立即加压包扎后送往医院 C. 立即送往医院行清创缝合
D. 立即送往医院行 CT 检查 E. 立即送往医院行开颅手术
13. 枕骨大孔疝不同于小脑幕切迹疝的临床表现是：
A. 头疼剧烈 B. 呕吐频繁 C. 意识障碍
D. 呼吸骤停出现早 E. 血压升高，脉搏缓慢有力
14. 徐先生，29岁，颅底骨折发现脑脊液鼻漏，护士在护理工作中要注意预防颅内感染，正确的是
A. 可作鼻腔冲洗 B. 禁止鼻腔冲洗 C. 鼻腔有漏液可用棉球堵塞
D. 鼓励咳嗽 E. 可作腰穿
15. 中间清醒期常出现于哪种颅脑损伤
A. 脑震荡 B. 脑挫裂伤 C. 颅内血肿
D. 硬脑膜外血肿 E. 硬脑膜下血肿
16. 诊断颅底骨折最可靠的临床表现是
A. 意识障碍 B. 头皮皮下出血 C. 脑脊液漏
D. 颅底骨折凹陷 E. 脑脊液含血
17. 女，22岁。头部受伤时意识丧失，20分后清醒，伴有逆行性健忘，1周来有轻度头痛，CT检查无异常。考虑为
A. 脑震荡 B. 脑挫裂伤 C. 硬脑膜外血肿 D. 硬脑膜下血肿 E. 脑缺血
18. 男性，21岁，右侧颞部被击伤后昏迷 30min 清醒，5h 后再度昏迷，伴右侧瞳孔逐渐散大，左侧肢体瘫痪，生命体征出现明显变化。应首先考虑
A. 脑震荡 B. 脑挫裂伤
C. 急性硬脑膜外血肿 D. 急性硬脑膜下血肿 E. 颅骨骨折
19. 颅底骨折脑脊液耳漏时下列处理错误的是
A. 应用抗生素 B. 应用止血剂 C. 抬高床头

- A. 一侧瞳孔立即散大 B. 双瞳孔不等圆 C. 双瞳孔大小多变
D. 双侧瞳孔散大 E. 一侧瞳孔进行性散大
34. 颅骨骨折患者的脑脊液经由鼻孔流出, 可能的骨折部位是
A. 颅前窝骨折 B. 颅中窝骨折 C. 颅后窝骨折
D. 颅盖骨骨折 E. 以上均不是
35. 头皮损伤后出现整个头部的肿胀. 张力低. 波动明显. 疼痛较轻. 可能是
A. 头皮血肿 B. 帽状腱膜下血肿 C. 骨膜下血肿
D. 硬膜外血肿 E. 硬膜下血肿
36. 为预防颅脑损伤病人发生脑水肿. 需将床头抬高 () cm.
A. 5-10 B. 10-15 C. 15-30 D. 30-40 E. 40-50
37. 李先生, 头部外伤后昏迷 2h, 曾呕吐数次. 入院时测血压 20/10. 7kPa (150/80mmHg), 脉搏 60 次/min. 考虑“脑挫裂伤”, 给予降低颅内压的主要措施是
A. 床头抬高 15-30cm B. 限制每日摄入量
C. 按时使用甘露醇 D. 吸氧、物理降温 E. 保持呼吸道通畅
38. 头皮下血肿与凹陷性颅骨骨折不易鉴别时可行哪项检查
A. B 超 B. X 线检查 C. 透视 D. 静脉造影 E. 穿刺抽血
- (39-40 题)
- 男, 40 岁, 被重物击中头部倒地昏迷。
39. 护士配合急救时应首先做的是
A. 检查神志、瞳孔 B. 测量血压脉搏呼吸 C. 输液、降颅内压
D. 保持呼吸道通畅 E. 防止休克
40. 治疗过程中, 为及时发现颅内病变发展, 最主要的观察指标是
A. 意识状态 B. 生命体征 C. 瞳孔 D. 尿量 E. 神经系统体征
41. 颅底骨折伴脑脊液漏禁忌耳鼻堵塞是为了
A 防止脑水肿 B 防止脑疝 C 降低颅内压
D 防止脑脊液丢失 E 防止颅内继发感染
42. 降低颅内压的首选脱水剂是
A 高渗葡萄糖 B 甘露醇 C 呋塞米 D 山梨醇 E 以上均可
43. 颅底骨折合并脑脊液漏下列哪项处理是不正确的
A. 避免用力咳嗽、打喷嚏、擤鼻 B. 避免堵塞及冲洗耳道、鼻腔
C. 不作腰穿 D. 给予抗生素 E. 少输液以减少脑脊液漏
44. 男 18 岁, 被砖块击中头部, 眼眶青紫, 球结膜下出血, 脑脊液鼻漏, 失明. 考虑最可能的损伤是
A. 颅盖骨折 B. 颅前窝骨折 C. 颅中窝骨折
D. 颅后窝骨折 E. 脑内出血
- (45--47)
- A. 熊猫眼征 B. 脑脊液耳漏 C. 中间清醒期
D. 腰穿脑脊液呈血性 E. 逆行性遗忘
45. 前颅窝骨折常出现

46. 中颅窝骨折常出现

47. 脑震荡常出现

(48-50 题)

- A 逆行性健忘 B 中间清醒期 C 伤后即意识障碍, 持续昏迷进行性加重
D “乒乓球样凹陷” E “熊猫眼”征

48. 硬膜外血肿的特征是

49. 硬膜下血肿的特征是

50. 颅盖骨折的特征是

(51-53 题)

- A 伤后眼眶青紫, 球结膜下出血, 脑脊液鼻漏, 失嗅, 失明
B 伤后耳后或枕区肿胀、青紫或淤斑, 脑脊液漏至胸锁乳突肌下
C 伤后耳后或乳突区肿胀、青紫或淤斑, 脑脊液耳漏或咽部流出, 面瘫和听力障碍
D 伤后耳前区肿胀、青紫或淤斑, 脑脊液耳漏或鼻漏, 三叉神经损伤表现
E 以上都不是

51. 颅后窝骨折

52. 颅中窝骨折

53. 颅前窝骨折

第十一章 颈部疾病病人的护理

1. 诊断甲亢最灵敏的指标是

- A. 基础代谢率 B. 放射免疫法测定 T_3 C. 放射免疫法测定 T_4
D. 血清蛋白结合碘测定 E. 甲状腺摄 ^{131}I 率测定

2. 基础代谢率的常用计算公式为

- A. (脉率+脉压)-111 B. (脉率-脉压)-111 C. (脉率×脉压)-111
D. (脉率-脉压)×111 E. (111-脉压)+脉率

3. 甲状腺次全切除术后立即发生声音嘶哑, 可能的原因是

- A. 喉头水肿 B. 甲状旁腺损伤 C. 喉上神经损伤
D. 喉返神经损伤 E. 甲状腺危象前兆

4. 现在认为甲状腺功能亢进属于

- A. 代谢性疾病 B. 自身免疫性疾病 C. 遗传性疾病
D. 先天性疾病 E. 内分泌失调性疾病

5. 压迫颈交感神经丛可出现霍纳综合征, 哪项不是主要表现

- A. 患侧眼球内陷 B. 患侧上睑下垂 C. 患侧瞳孔缩小
D. 声音嘶哑 E. 同侧面部无汗

6. 甲状腺危象的主要原因是

- A. 手术时过多挤压甲状腺 B. 术前准备未达要求
C. 切除腺体不足 D. 切除腺体过多 E. 手术中过度紧张

7. 甲亢术后最危险的并发症是:

- A. 术后呼吸困难和窒息 B. 甲状旁腺损伤 C. 喉返神经损伤

- D. 喉上神经损伤 E. 甲状腺危象
8. 甲状腺功能亢进病人具有特征性的表现是
A. 易激动 B. 食量大而消瘦 C. 低热、多汗
D. 药物不易缓解的心动过速 E. 收缩压明显升高
9. 甲状腺功能亢进病人术后出现误咽、呛咳，是因为损伤了
A. 喉上神经内支 B. 喉上神经外支 C. 单侧喉返神经
D. 双侧喉返神经 E. 甲状旁腺
10. 甲亢患者下列哪项未达到手术前准备标准
A 脉率 100/min B BMR 小于+20% C 情绪稳定，睡眠好转
D 体重增加 E 甲状腺体缩小变硬
11. 甲状腺手术后突然导致呼吸困难和窒息的最常见原因是：
A. 切口内出血形成血肿 B. 双侧喉返神经损伤
C. 气管软化塌陷 D. 粘痰堵塞气道 E. 急性喉头水肿
12. 基础代谢率正常值是：
A. $\pm 10\%$ B. $\pm 20\%$ C. 20% D. 30% E. 20%-30%
13. 双侧甲状腺大部切除术后第 3 天病人出现足疼痛、手足抽搐，护士需立即准备哪种药物：
A. 氯化钠 B. 葡萄糖酸钙 C. 碳酸氢钠
D. 磷脂碘 E. 碘化钠
14. 甲亢患者术前服碘的方法是：
A. 由 3 滴开始，逐日增加 1 滴，每日 3 次至 16 滴止
B. 由 3 滴开始，逐日每次增加 1 滴，每日 3 次至 16 滴止
C. 由 3 滴开始，逐日每次增加 1 滴，每日 2 次至 16 滴止
D. 由 3 滴开始，逐日每次增加 1 滴，每日 1 次至 16 滴止
E. 由 3 滴开始，逐日增加 2 滴，每日 2 次至 16 滴止
15. 甲亢病人术前禁用：
A. 心得安 B. 鲁米那 C. 阿托品 D. 丙基硫氧嘧啶 E. 舒乐安定
16. 甲状腺危象预防的关键是：
A. 病人情绪稳定 B. 术后抗感染治疗 C. 充分的术前准备
D. 医生手术仔细 E. 术后降温
17. 甲亢的手术禁忌症是：
A. 高功能腺瘤 B. 胸骨后甲状腺肿并甲亢 C. 妊娠早期甲亢
D. 青少年甲亢 E. 内科治疗复发者
18. 判断甲亢病情严重程度主要根据
A. 突眼程度 B. 甲状腺大小 C. 情绪是否稳定
D. 体重是否增加 E. 脉率和脉压大小
19. 甲亢手术前，为抑制甲状腺激素的释放，并使腺体缩小变硬，常用的药物是
A 卢戈液 B 心得安 C 他巴唑 D 丙硫氧嘧啶 E 安定
20. 单纯甲状腺肿最常见的原因是
A. 饮食缺碘 B. 生长发育快 C. 服用致甲状腺肿物质
D. 自身免疫性原因 E. 感染

21. 有关甲状腺手术后导致呼吸困难的原因, 不包括下列哪一项
A. 伤口内出血、压迫气管 B. 双侧喉上神经损伤 C. 双侧喉返神经损伤
D. 急性喉头水肿 E. 气管软化、塌陷
22. 女性, 28 岁, 清晨测血压 130/70mmHg, 脉率 95 次/分, 判断其甲状腺功能属于
A. 低于正常 B. 正常 C. 轻度甲亢 D. 中度甲亢 E. 重度甲亢
23. 患者刘某, 因甲亢进行甲状腺大部切除术, 回病房 2h 后突感呼吸困难, 颈部肿胀, 可能是
A. 喉上神经内侧支损伤 B. 喉上神经外侧支损伤
C. 单侧喉返神经损伤 D. 双侧喉返神经损伤 E. 颈部切口内出血
24. 女, 38 岁, 因甲亢行甲状腺大部切除术, 术后数小时出血, 使颈部迅速肿大, 呼吸困难。此时首先应
A. 吸氧 B. 拆线 C. 颈部置冰袋
D. 口服复方碘剂 E. 应用呼吸兴奋剂
25. 赵女士, 40 岁, 自述怕热, 多汗, 烦躁焦虑, 食量大, 体重减轻, 每日大便 3-4 次, 在某医院诊断为甲状腺功能亢进。其不正确的护理诊断/医护合作性问题是
A. 营养失调: 低于机体的需要量 B. 体温调节无效
C. 腹泻 D. 焦虑 E. 潜在并发症: 甲状腺危象
26. 患者在甲状腺大部切除手术后一回到病房, 护士就要求其回答问题, 目的是为了评估患者有无
A. 意识障碍 B. 神经损伤 C. 麻醉清醒 D. 记忆受损 E. 痰液阻塞
27. 男性, 31 岁, 因甲亢行甲状腺次全切除术, 术后第 2 天, 饮水时发生误咽, 继而出现声调降低, 但无声音嘶哑, 下列最可能的是
A. 喉上神经内外支损伤 B. 甲状旁腺损伤 C. 甲状腺危象
D. 喉返神经损伤 E. 喉头水肿
- (28-29 题)
- A. 声调降低 B. 声音嘶哑 C. 饮水呛咳 D. 手足抽搐 E. 进行性呼吸困难
28. 甲状旁腺损伤
29. 喉上神经外支损伤

第十二章 乳房疾病病人的护理

1. 早期乳癌最常见的症状(首发症状)是
A. 乳房皮肤桔皮样变 B. 乳头溢液 C. 乳房内无痛性肿块
D. 乳房肿胀, 全身发热 E. 表面易出血, 有恶臭
2. 乳腺癌最早转移的淋巴结是
A. 同侧腋下淋巴结 B. 锁骨下淋巴结 C. 锁骨上淋巴结
D. 胸骨旁淋巴结 E. 对侧腋下淋巴结
3. 乳腺癌最常发生的部位
A. 乳头及乳晕区 B. 乳房外上象限 C. 乳房外下象限
D. 乳房内上象限 E. 乳房内下象限

4. 乳癌病人乳房皮肤出现“橘皮样变”是因为
 - A. 癌细胞团堵塞皮下淋巴管
 - B. 癌肿侵犯 Cooper 韧带
 - C. 癌肿与胸肌粘连
 - D. 癌肿与皮肤粘连
 - E. 癌肿侵犯乳管
5. 乳癌时乳房悬韧带受累时可出现
 - A. 皮肤水肿
 - B. 乳头凹陷
 - C. 湿疹样变
 - D. 橘皮样改变
 - E. “酒窝征”
6. 乳癌根治术属于
 - A. 择期手术
 - B. 限期手术
 - C. 急症手术
 - D. 诊断性手术
 - E. 姑息性手术
7. 下列哪项不是乳腺癌发生的相关因素
 - A. >40 岁不孕
 - B. 初次足月产年龄<30 岁
 - C. 高脂饮食
 - D. 母亲为乳癌病人
 - E. 月经初潮年龄<12 岁
8. 一、二期乳腺癌的主要治疗方法是
 - A. 放射疗法
 - B. 免疫疗法
 - C. 化学疗法
 - D. 生物疗法
 - E. 手术疗法
9. 确诊乳腺肿块性质最可靠的办法是
 - A. 乳房触诊
 - B. 乳头溢液检查
 - C. 乳房 X 线的检查
 - D. 活组织切片检查
 - E. B 超
10. 女, 30 岁, 因乳癌做根治术, 并经化疗, 出院前进行健康指导, 以下哪项对预防复发最重要
 - A. 加强营养
 - B. 参加体育活动增强体质
 - C. 五年内避免妊娠
 - D. 经常自查乳房
 - E. 定期来院复查
11. 女性, 48 岁, 左乳癌根治术后上肢活动受限。护士指导其患侧肢体功能锻炼, 应达到的目的是
 - A. 手能摸到同侧耳朵
 - B. 肩能平举
 - C. 肘能屈伸
 - D. 手摸到对侧肩部
 - E. 手经头摸到对侧耳朵
12. 中年女性, 经常出现乳头血性溢液, 查提未触及肿块, 首先考虑
 - A. 乳癌
 - B. 乳房纤维腺瘤
 - C. 乳房囊性增生病
 - D. 乳管内乳头状瘤
 - E. 乳房脂肪瘤

(13-16 题)

女, 48 岁, 未婚, 左侧乳房出现无痛性肿块, 边界不清, 质地坚硬, 直径为 4cm, 同侧腋窝 2 个淋巴结肿大, 无粘连, 诊断为乳癌, 需手术治疗

13. 该病人的乳癌分期为
 - A. 第一期
 - B. 第二期
 - C. 第三期
 - D. 第四期
 - E. 晚期
14. 此病人术前备皮范围是
 - A. 胸部、同侧腋下及颈部
 - B. 胸部、同侧腋下
 - C. 胸部、同侧腋下及上臂
 - D. 胸部、上臂
 - E. 胸部、双侧腋下
15. 上述病人乳癌根治术后, 为预防皮下积液及皮瓣坏死的主要措施是
 - A. 半卧位
 - B. 加压包扎伤口
 - C. 抬高同侧上肢
 - D. 局部沙袋压迫
 - E. 引流管持续负压吸引
16. 下列关于病人的术后护理措施, 不正确的是
 - A. 抬高患侧上肢
 - B. 患侧胸壁加压包扎

- C. 保持引流管通畅 D. 早期活动患肢 E. 不在患肢测血压
(17-19题)
A. 周期性疼痛 B. 肿块增长缓慢, 边界清楚且能推动 C. 肿块固定且腋窝淋巴结肿大
D. 乳头血性溢液 E. 早期患侧乳房肿痛伴发热
17. 乳房纤维腺瘤
18. 急性乳房炎
19. 乳腺癌
(20-21题)
A. 肌肉 B. 淋巴管 C. 表皮 D. 库伯韧带 E. 神经
20. 乳房局部皮肤呈“桔皮样”改变是因癌肿侵及:
21. 乳腺癌病人癌肿表面皮肤凹陷呈“酒窝征”是因癌肿侵及:
22. 急性乳房炎的致病菌多为
A. 变形杆菌 B. 白色葡萄球菌 C. 金黄色葡萄球菌
D. 溶血性链球菌 E. 大肠杆菌
23. 急性乳腺炎形成脓肿后的最主要的治疗措施是
A. 应用广谱抗生素 B. 消除乳汁淤积 C. 及时切开引流
D. 局部热敷、理疗 E. 终止哺乳
24. 急性乳房炎多发生于:
A. 妊娠妇女 B. 初产妇产后 3-4 周哺乳期妇女 C. 乳头凹陷的妇女
D. 哺乳 6 个月后的妇女 E. 长期哺乳的妇女
25. 哺乳期妇女预防急性乳房炎的最主要措施是
A. 保持乳头清洁 B. 养成定时哺乳习惯 C. 每次哺乳排空乳汁
D. 及时治疗破损乳头 E. 婴儿睡觉时不含乳头
26. 乳房纤维腺瘤最常发生的部位是
A. 乳房外上象限 B. 乳房内上象限 C. 乳房外下象限
D. 乳房内下象限 E. 乳头及乳晕区
27. 女、26 岁、乳房肿块分界不清、月经来潮时乳房疼痛多提示 ()
A. 慢性乳房炎 B. 乳房囊性增生病
C. 乳腺癌 D. 乳房纤维瘤 E. 乳房脓肿
28. 急性乳腺炎的主要病因是
A. 全身和局部抵抗力的下降 B. 乳腺组织发育不良
C. 乳汁淤积加细菌入侵 D. 哺乳次数过多 E. 乳腺分泌障碍

第十三章 胸部疾病病人的护理

1. 对胸膜腔闭式引流管的护理, 错误的是:
A. 引流管应防止曲折和受压 B. 妥善固定
C. 引流不畅用无菌生理盐水冲洗 D. 水封瓶仅可高于病人胸腔出口水平 10cm
E. 经常协助病人更换体位
2. 胸部外伤患者, 体检: 伤侧肋间隙饱满, 呼吸运动减弱, 气管向健侧移位, 伤侧上胸

- 部叩诊呈鼓音，下胸部浊音，听诊伤侧呼吸音消失，应考虑为
- A. 血胸 B. 气胸 C. 血气胸 D. 脓胸 E. 脓气胸
3. 胸部损伤中最常见的是
- A. 肋骨骨折 B. 气胸 C. 血胸 D. 血气胸 E. 创伤性窒息
4. 反常呼吸运动见于
- A. 开放性气胸 B. 闭合性气胸 C. 张力性气胸
D. 相邻多根多处肋骨骨折 E. 损伤性血胸
5. 病人右胸部外伤后，胸部局部软化浮动，出现反常呼吸运动，应考虑：
- A. 气胸 B. 血胸 C. 胸壁软组织损伤
D. 皮下气肿 E. 多处多根肋骨骨折
6. 护士巡视病房时发现病人闭式胸膜腔引流管脱出，应首先：
- A. 立即报告医生 B. 用无菌凡士林纱布、厚层纱布封闭引流口
C. 把脱出的引流管重新插入 D. 给病人吸氧 E. 急送手术室处理
7. 胸膜腔引流管自胸壁伤口脱出，首先应
- A. 嘱病人屏气 B. 给病人吸氧 C. 更换引流管 D. 重新插入
E. 用手指捏紧引流口周围的皮肤
8. 排气时胸膜腔闭式引流管放置于
- A. 腋中线第7肋间 B. 腋中线第2肋间 C. 腋中线第3肋间
D. 锁骨中线第2肋间 E. 锁骨中线第7肋间
9. 开放性气胸急救的首要措施是
- A. 吸氧 B. 应用抗生素 C. 立即清创
D. 镇静止痛 E. 封闭胸壁伤口
10. 张力性气胸急救的首要措施是
- A. 高流量吸氧 B. 胸膜腔穿刺排气减压
C. 立即手术探查 D. 应用抗生素 E. 快速输液抗休克
11. 闭合性气胸无明显症状，说明肺萎陷在
- A. 15%以下 B. 30%以下 C. 45%以下 D. 60%以下 E. 75%以下
12. 气胸患者闭式胸膜腔引流的装置哪项错误
- A. 锁骨中线第2肋间插管 B. 长玻璃管口在水面下3cm C. 短玻璃管与大气相通
D. 整个装置均需密闭 E. 水封瓶距离引流口30cm
13. 肋骨骨折最易发生在
- A. 1-3肋 B. 4-7肋 C. 5-8肋 D. 8-10肋 E. 11-12肋
14. 开放性胸部损伤的正确定义是：
- A. 胸壁有伤口 B. 胸壁伤口与胸膜腔相通 C. 支气管断裂与胸膜腔相通
D. 肋骨骨折合并气胸 E. 气胸伴皮下气肿
15. 以下哪种胸部损伤应首先处理
- A. 肋骨骨折 B. 闭合性气胸 C. 开放性气胸
D. 张力性气胸 E. 开放性软组织损伤
16. 胸膜腔闭式引流瓶应低于胸腔出口平面至少

- A. 30 cm B. 60 cm C. 90 cm D. 100 cm E. 50 cm

17. 闭式胸膜腔引流后的护理，错误的操作是
A 引流瓶内短管与引流管相接，长管开放 B 病人取半卧位 C 保持引流管通畅
D 引流管不能高于病人胸腔平面 E 观察记录引流液的量及性质
18. 诊断肋骨骨折最具价值的辅助检查是
A. CT B. X线 C. B超 D. MRI E. 造影
19. 闭式胸腔引流时，若引流瓶破裂，正确的处理方法是
A. 直接更换新瓶 B. 立即用血管钳夹闭软质引流管
C. 立即拔除引流管 D. 用无菌敷料覆盖引流管外口后更换新的无菌引流瓶
E. 以上都不对

(20-21)

患者左侧胸部被匕首刺伤半小时，有胸痛，呼吸急促，口唇发绀。脉搏 120 次/分，血压 9.3/5.3kPa (70/40mmHg)。左侧胸壁有伤口，呼吸时能听到空气出入伤口的响声。气管移向健侧。患侧叩诊呈鼓音。

20. 应首先考虑此患者为
A. 闭合性气胸 B. 开放性气胸 C. 张力性气胸
D. 损伤性血胸 E. 胸壁软组织刺伤
21. 引起病人休克的主要原因是
A. 血容量不足 B. 健侧肺部分受压 C. 伤侧肺完全萎陷
D. 心脏受压 E. 纵隔摆动、回心血量减少

(22-23)

男，24 岁，因车祸胸部受伤来医院急诊，经吸氧后呼吸仍窘迫并有发绀。体格检查：右胸部饱满，呼吸音消失，叩诊呈鼓音，右胸部有骨擦音、皮下气肿。

22. 该病人最可能的诊断为
A. 开放性气胸、肋骨骨折 B. 张力性气胸、肋骨骨折
C. 闭合性气胸、肋骨骨折 D. 损伤性血胸、多发性肋骨骨折
E. 张力性气胸、血胸
23. 首要的急救措施是
A. 输血、输液 B. 抗休克 C. 行闭式胸腔引流术
D. 剖胸探查 E. 排气减压

(24-25 题)

祁先生. 男. 36 岁. 车祸中被钢筋刺伤左腋下，出现烦躁不安. 呼吸困难. 口唇发绀. 左腋下胸壁有伤口，呼吸时有气体出入的“嘶嘶”声，气管向健侧移位。患侧胸部叩诊鼓音。

24. 该病人属于()损伤
A. 肋骨骨折 B. 开放性气胸 C. 闭合性气胸
D. 张力性气胸 E. 血胸
25. 该病人最重要的护理诊断/问题是
A. 气体交换受损 B. 体液不足 C. 疼痛
D. 心排出量减少 E. 恐惧

(26-28 题)

- A. 反常呼吸
- B. 胸膜损伤后, 空气进入胸膜腔, 伤口闭合
- C. 肺裂伤破裂处形成活瓣, 气体只能进胸膜腔而不能排出体外
- D. 胸壁有开放性伤口与胸膜腔相通, 呼吸时空气经伤口自由进出胸膜腔
- E. 肺组织损伤血液积聚于胸膜腔

- 26. 张力性气胸
- 27. 开放性气胸
- 28. 闭合性气胸

(29-31 题)

- A 固定胸壁
- B 剖胸探查
- C 迅速封闭胸壁伤口
- D 抗感染
- E 穿刺排气减压

- 29. 开放性气胸的紧急处理应
- 30. 张力性气胸的紧急处理应
- 31. 多根多处肋骨骨折的紧急处理应
- 32. 下列哪项不是诊断肺癌的依据
 - A. 胸痛、咳嗽、咯血
 - B. 痰细胞学检查
 - C. X 线胸部平片有细短毛刺状肿块阴影
 - D. 纤维支气管镜检查
 - E. CT 检查
- 33. 肺癌大多起源于
 - A 肺毛细血管
 - B 肺动脉
 - C 肺静脉
 - D 肺泡上皮
 - E 支气管粘膜上皮
- 34. 肺癌最重要的危险因素是
 - A. 吸烟
 - B. 空气污染
 - C. 职业因素
 - D. 电离辐射
 - E. 维生素 A 含量低
- 35. 肺癌最早出现的症状是
 - A. 咯血
 - B. 刺激性干咳
 - C. 发热
 - D. 胸痛
 - E. 侵犯喉返神经
- 36. 早期食管癌的临床表现哪项不符
 - A. 咽下食物哽噎感
 - B. 胸骨后刺痛感
 - C. 声音嘶哑
 - D. 食管内异物感
 - E. 上腹部烧灼感
- 37. 食管癌的早期症状为:
 - A 进食后呕吐
 - B. 进食后呛咳
 - C. 进食后哽噎感
 - D. 进行性吞咽困难
 - E. 体重减轻
- 38. 食管癌最典型的临床表现是
 - A. 明显消瘦
 - B. 贫血
 - C. 进行性吞咽困难
 - D. 食物哽噎感
 - E. 进食呛咳
- 39. 食管癌术后护理中错误的是
 - A. 保持胃肠减压管通畅
 - B. 静脉补液维持营养
 - C. 注意口腔卫生
 - D. 术后肠蠕动恢复即可进食
 - E. 注意并发吻合口瘘
- 40. 食管癌最多见的发生部位是:
 - A. 颈部食管
 - B. 胸部上段食管
 - C. 胸部中段食管
 - D. 胸部下段食管
 - E. 腹段食管

41. 筛查食管癌简便而有效的方法是
A 纤维食管镜检查 B X线钡餐检查 C. CT 检查
D 食管脱落细胞学检查 E 活组织检查
42. 男, 55 岁, 进行性吞咽困难 6 个月。消瘦, 左侧锁骨上窝有一直径约 2cm 的淋巴结, 质硬, 不能推动。应首先考虑为
A 胃癌 B 食管癌 C 胃溃疡 D 食管炎 E 喉头水肿

第十四章 急性化脓性腹膜炎与腹部损伤病人的护理

1. 腹膜炎患者术后取半卧位的目的不包括
A. 有利呼吸 B. 减轻毒血症 C. 预防膈下脓肿 D. 加快肠蠕动 E. 减轻疼痛
2. 急性腹膜炎腹腔穿刺抽出脓液, 略带臭味, 最可能是
A. 急性阑尾炎穿孔 B. 急性胃穿孔 C. 急性胰腺炎 D. 小肠扭转 E. 宫外孕
3. 判断继发性和原发性腹膜炎的主要依据是
A. 腹痛的特点 B. 致病菌种类 C. 症状和体征的轻重
D. 腹腔内有无原发病灶 E. 呕吐物的性质
4. 继发性腹膜炎与原发腹膜炎的主要区别是
A. 腹痛性质 B. 腹肌紧张程度 C. 腹腔内有无原发病灶
D. 腹腔是否与外界相通 E. 病原菌种类
5. 继发性腹膜炎最常见的致病菌是
A. 大肠杆菌 B. 肺炎球菌 C. 变形杆菌 D. 绿脓杆菌 E. 溶血性链球菌
6. 急性腹膜炎治疗后最常见的残余脓肿是
A. 膈下脓肿 B. 盆腔脓肿 C. 肠间隙脓肿 D. 肝脓肿 E. 脾周围脓肿
7. 急性腹膜炎最主要的症状是
A. 持续性腹痛 B. 腹膜刺激征 C. 出现移动性浊音
D. 肠鸣音减弱或消失 E. 感染中毒症状
8. 急性腹膜炎最主要的体征是
A. 持续性腹痛 B. 腹膜刺激征 C. 出现移动性浊音
D. 肠鸣音减弱或消失 E. 感染中毒症状
9. 关于急性腹膜炎的护理, 哪项是错误的
A 一般取半卧位 B 大剂量应用抗生素 C 胃肠减压 D 禁食
E 绝对不能使用镇痛药
10. 护理胃肠减压的患者时, 哪项是错误的
A 及时更换引流瓶 B 观察并记录引流液数量及性状 C 注意口腔护理
D 在口服药物后胃肠减压仍应持续进行 E 维持水和电解质平衡
11. 胃肠减压护理下列哪项不正确 ()
A. 病人应禁食 B. 保持减压管通畅
C. 胃管堵塞禁止冲洗 D. 注意口腔护理 E. 记录吸出液的量及性质
12. 给予诊断不明确的急性腹腔炎病人下列哪项护理措施是错误的
A. 采取半卧位 B. 给予胃肠减压 C. 应用哌替啶止痛

- D. 禁食 E. 禁忌灌肠
13. 继发性腹膜炎感染毒性剧烈是由于：
A. 金黄色葡萄球菌感染 B. 大肠杆菌感染 C. 溶血性链球菌感染
D. 肺炎双球菌感染 E. 各种细菌混合感染
14. 胃肠减压最可靠的拔管指征是
A. 体温正常 B. 腹胀消失 C. 肠鸣间恢复 D. 食欲增加 E. 肛门排气
15. 腹膜炎术后半卧位的目的除外。
A. 利于渗液引流致盆腔. B. 腹肌松弛缓痛 C. 减少毒素吸收
D. 预防压疮 E. 利于呼吸循环
16. 胃肠减压期间的护理，错误的是
A 病人应禁食及停止口服药物 B 随时观察吸引是否有效 C 注意口腔卫生
D 及时更换引流瓶 E 若发现胃管有鲜红血液吸出，继续持续引流
17. 下列哪项不是外科治疗胃十二指肠溃疡的适应症
A. 并发急性穿孔 B. 并发急性大出血 C. 胃溃疡恶变
D. 慢性萎缩性胃炎 E. 并发幽门梗阻
- (18-21 题)
- A 黄色、浑浊、无臭味、可有食物残渣 B 不凝血液 C 稀脓性略带臭味
D 血性脓液臭味明显 E 血性，胰酶（胰淀粉酶）含量高
18. 胃十二指肠穿孔的腹穿液
19. 实质性脏器破裂的腹穿液
20. 绞窄性肠梗阻的腹穿液
21. 急性阑尾炎穿孔的腹穿液
22. 判断空腔脏器穿孔最有价值的发现是
A 移动性浊音 B X 线示膈下游离气体 C 腹膜刺激征
D 腹胀 E 剧烈腹痛
23. 诊断腹腔内实质性器官损伤最可靠的依据是
A. 腹肌紧张 B. 腹部压痛，反跳痛 C. 膈下游离气体
D. 移动性浊音 E. 腹腔穿刺抽出不凝固血液
24. 区别空腔脏器破裂与实质脏器破裂的最重要的依据是
A. 外伤史 B. 腹痛程度 C. 腹膜刺激征轻重
D. 有无移动性浊音 E. 腹腔穿刺液性状
25. 受伤当时无明显症状，几天后突然出现急性大出血的危险情况，可能的内脏损伤是
A. 小肠破裂 B. 直肠破裂 C. 脾脏被膜下破裂 D. 结肠破裂 E. 胆囊穿孔
26. 下列哪种脏器损伤，临床表现以腹膜炎为主
A. 肝 B. 脾 C. 胰 D. 肠 E. 肾
27. 救治严重腹部损伤患者的首要措施是
A. 禁食输液 B. 应用抗生素 C. 预防休克
D. 禁用吗啡类止痛剂 E. 应用破伤风抗毒素
28. 男，40 岁，汽车撞击左上腹，出现面色苍白冷汗脉搏 120 次/min，血压 80/60mmHg，

移动性浊音阳性, 肠鸣音减弱. 该病人首选的处理方法是

- A 抗休克 B 迅速手术 C 先抗休克后手术
D 边抗休克边手术 E 先做手术后抗休克
29. 当腹部闭合性损伤尚未明确, 在观察期间下列哪项措施是不恰当的
A. 不随便搬动患者, 以免加重伤情 B. 注射止痛剂, 以防止创伤性休克
C. 不给饮食, 以防消化道穿孔者腹腔污染加重
D. 注射广谱抗生素, 预防和治疗可能存在的感染 E. 胃肠减压, 减轻腹胀
30. 患者, 女性, 腹部损伤 3h, 疑有内脏损伤. 护理措施不包括
A. 积极做好术前准备 B. 严密观察病情变化
C. 用吗啡止痛 D. 防治休克 E. 禁饮食, 胃肠减压
31. 可减少腹腔毒素的吸收体位是
A. 平卧位 B. 侧卧位 C. 俯卧位 D. 半卧位 E. 头低足高位
32. 怀疑有胃肠道损伤患者, 住院观察期间应禁忌 。
A. 针刺止痛 B. 半卧位 C. 腹胀便秘时灌肠
D. 胃肠减压 E. 用抗生素
33. 女性, 17 岁, 因车祸致腹部开放性损伤, 伴少量肠管脱出, 正确的紧急处理是
A. 敞开伤口, 急诊手术 B. 用消毒棉垫加压包扎
C. 迅速将肠管还纳入腹腔 D. 用凡士林纱布覆盖, 腹带加压包扎
E. 等渗盐水无菌纱布覆盖并妥善保存
34. 男, 25 岁, 因被拖拉机辗伤入院. 体查: 呼吸 36/分, 急促, 唇紫绀, 神志欠清, 血压 10/8kPa(60mmHg), 左下肺呼吸音减低, 左下胸壁有一伤口溢血及气泡, 腹肌紧张, 压痛及反跳痛, 肠鸣音消失. 右下腹穿刺抽出不凝固血性液体. 入院后的紧急抢救措施下列哪项不妥?
A. 立即给氧 B. 输血、输液 C. 应用血管活性药物
D. 封闭胸部伤口 E. 立即行剖腹探查术
35. 腹腔中最容易损伤的脏器是
A. 胃 B. 腹壁血肿 C. 肝、脾破裂 D. 小肠破裂 E. 胆囊破裂
36. 腹部损伤行腹腔穿刺抽得不凝固血液, 应考虑为
A 空腔脏器损伤 B 实质性脏器损伤 C 后腹膜血肿
D 误穿入腹腔血管 E 前腹壁血肿
- (37-39 题)
- 年轻女性, 撞伤腹部 4h, 患者面色苍白, 四肢厥冷, 血压 10/7.1kPa, 脉率 140/min, 全腹轻度压痛、反跳痛与肌紧张, 腹部透视无异常。
37. 应考虑
A 胃破裂 B 肝脾破裂 C 十二指肠破裂
D 严重腹壁软组织挫伤 E 腹膜后血肿
38. 以下处理哪项是错误的
A 给氧 B 避免活动 C 给予流质或半流质饮食
D 注意腹部症状和体征的变化 E 观察生命体征
39. 在观察期间应禁用

A 青霉素 B 甲硝唑 C 吗啡 D 多巴胺 E 酚磺乙胺（止血敏）

（40-41 题）

男性，25 岁。因车祸撞伤腹部，病人诉腹痛难忍，伴恶心、呕吐，X 线腹透，见膈下游离气体，拟诊为胃肠道外伤性穿孔。

40. 有确定性诊断意义的表现是

- A. 腹膜刺激征 B. 肠鸣音消失 C. 腹腔穿刺抽出混浊液体
D. 白细胞计数增高 E. 感染中毒症状

41. 该病人的处理不正确的是

- A. 禁食、输液 B. 胃肠减压 C. 应用大剂量抗生素
D. 给予吗啡止痛 E. 尽快术前准备

（42-43 题）某男性病人因外伤造成脾破裂入院，手术后第 2 天出现烦躁不安、恶心、呕吐、T38.5℃，P120 次/min，R23 次/min，尿量 24h 为 250ml，尿比重 1.010，血钠 135mmol/L，血钾 7.0mmol/L，pH7.3，尿素氮 22mmol/L。

42. 该病人可能发生了

- A. 失血性休克 B. 急性肾衰竭 C. 高钾血症 D. 尿毒症 E. 心功能不全

43. 该病人的治疗原则应是

- A. 保护肾功能，纠正水、电解质、酸碱平衡紊乱 B. 限制钾盐摄入
C. 迅速扩容，纠正休克 D. 保护心功能 E. 积极处理原发病

（44-46 题）

女，30 岁。左上腹被撞伤后出现烦躁不安、面色苍白、皮肤湿冷，血压 80/60 mmHg，脉搏细速、无尿。

44. 该病人当前最主要的护理诊断是

- A 恐惧 B 排尿异常 C 体液不足 D 有感染的危险 E. 体温过低

45. 应立即采取的护理措施是

- A. 安定病人情绪 B. 将病人安置到抢救室 C. 开放 2 条静脉通路
D. 准备抢救用物 E. 监测病情变化

46. 对病人应采用的体位是

- A. 头低足高位 B. 侧卧位 C. 下肢平放，头抬高 30℃
D. 斜坡卧位 E. 中凹位

（47-50 题）

- A. 非手术治疗 B. 密切观察, 暂不手术 C. 迅速手术
D. 先抗休克后手术 E. 边抗休克边手术

47. 腹部实质性器官损伤伴休克

48. 腹部空腔器官损伤伴休克

49. 腹部损伤诊断不明

50. 单纯性粘连性肠梗阻

（51-54 题）

- A. 腹腔内出血表现 B. 急性腹膜炎表现，X 线检查多见膈下游离气体
C. 既有内出血表现，又有腹膜炎表现 D. 腹膜后积气 E. 呕血和黑便

51. 脾破裂的表现主要是：

- 52. 肝破裂的主要表现是:
- 53. 胃穿孔的主要表现是:
- 54. 肝硬化食管-胃底静脉曲张出血的表现是:

第十五章 胃肠疾病病人护理

- 1. 最易嵌顿的腹外疝是
 - A. 腹股沟斜疝
 - B. 腹股沟直疝
 - C. 股疝
 - D. 脐疝
 - E. 切口疝
- 2. 最常见的疝内容物是
 - A. 大网膜
 - B. 膀胱
 - C. 小肠
 - D. 直肠
 - E. 乙状结肠
- 3. 关于直疝三角, 不正确的叙述是
 - A. 外侧边为腹壁下动脉
 - B. 内边为腹直肌外侧缘
 - C. 底边为腹股沟韧带内侧
 - D. 腹股沟斜疝由此突出
 - E. 腹股沟斜疝内环位于其外侧
- 4. 绞窄疝与嵌顿疝的根本区别在于
 - A. 疝块的大小
 - B. 疝内容物能否回纳
 - C. 有无肠梗阻表现
 - D. 疝块的有无压痛
 - E. 疝内容物有无血运障碍
- 5. 需紧急手术的腹外疝是
 - A. 难复性疝
 - B. 嵌顿性疝
 - C. 绞窄性疝
 - D. 滑动性疝
 - E. 可复性疝
- 6. 斜疝修补术后, 预防阴囊水肿的措施是
 - A. 平卧位, 膝下垫软枕
 - B. 切口沙袋压迫, 托起阴囊
 - C. 咳嗽时用手按住伤口
 - D. 不宜过早下床活动
 - E. 预防便秘、尿潴留
- 7. 治疗腹股沟疝最常用的方法是:
 - A. 疝成形术
 - B. 疝囊高位结扎术
 - C. 疝修补术
 - D. 手法复法
 - E. 疝环填补术
- 8. 最常见的腹外疝是:
 - A. 股疝
 - B. 腹股沟直疝
 - C. 腹股沟斜疝
 - D. 脐疝
 - E. 切口疝
- 9. 腹外疝的疝环是指:
 - A. 疝内容物突出的地方
 - B. 疝外被盖组织
 - C. 腹壁缺损或薄弱处
 - D. 壁层腹膜的一部分
 - E. 疝囊颈部
- 10. 鉴别腹股沟斜疝与直疝最有意义的体征是
 - A. 疝块的形状
 - B. 疝块是否降入阴囊
 - C. 单侧或双侧
 - D. 是否易嵌顿
 - E. 回纳疝块后, 压住内环, 增加腹内压是否脱出
- 11. 腹外疝术后护理不正确的是
 - A. 平卧 3 天膝下垫一软枕
 - B. 术后当日可进流食
 - C. 预防感染
 - D. 预防术后出血
 - E. 早期下床活动
- 12. 咳嗽病人接受疝手术的主要危害是
 - A. 伤口疼痛
 - B. 影响修复
 - C. 术后复发
 - D. 术后出血
 - E. 术后切口感染
- 13. 绞窄性疝的处理原则是:
 - A. 紧急手术
 - B. 手法复位
 - C. 对症治疗
 - D. 抗感染
 - E. 支持治疗
- 14. 所谓嵌顿性疝是指:

- A. 疝内容物为盲肠 B. 疝内容物为乙状结肠 C. 疝内容物为膀胱壁
D. 疝内容物为横结肠 E. 疝囊颈弹性收缩, 将疝内容物卡住不能回缩
15. 疝内容物进入阴囊的是:
A. 腹股沟直疝 B. 腹股沟斜疝 C. 切口疝 D. 股疝 E. 肠管壁疝
16. 腹外疝的发病因素中最重要的是
A. 妊娠 B. 长期便秘 C. 慢性咳嗽 D. 排尿困难 E. 腹壁强度降低
17. 6个月婴儿腹部包块, 随腹压增高而发生变化, 诊断为腹股沟斜疝。治疗的原则是
A. 紧急手术 B. 择期手术 C. 早期手术 D. 暂不手术 E. 禁忌手术
- (18-20)
- 男性, 35岁, 患腹外疝一年, 站立或咳嗽时右侧腹股沟区出现疝块, 可进入阴囊, 平卧或用手推送, 疝块可回纳腹腔而消失。
18. 其疝环是
A. 股环 B. 卵圆窝 C. 腹股沟管浅环 D. 腹股沟管深环 E. 腹股沟三角
19. 回纳疝块时, 可闻及肠鸣音, 疝内容物最可能的是
A. 乙状结肠 B. 小肠 C. 膀胱 D. 大网膜 E. 直肠
20. 若病人用力排便时, 疝块突然增大不能回纳, 伴有局部疼痛和压痛, 此时疝的临床类型属于
A. 易复性疝 B. 难复性疝 C. 嵌顿性疝 D. 滑动性疝 E. 绞窄性疝
- (21-23题)
- 男50岁, 有慢性便秘多年, 每次排便必须十分用力。近半年来发现, 站立劳动时阴囊出现肿块, 呈梨形、平卧时可还纳, 局部检查, 触诊发现外环扩大, 嘱病人咳嗽指尖有冲击感, 手指压迫内环处, 站立咳嗽, 肿块不再出现。拟诊腹外疝, 准备手术治疗。
21. 本病例属于哪种腹外疝
A. 腹股沟斜疝 B. 腹股沟直疝 C. 股疝 D. 脐疝 E. 切口疝
22. 下列哪项术前处理可避免术后疝的复发
A. 治疗便秘 B. 备皮 C. 排尿 D. 灌肠 E. 麻醉前用药
23. 术后预防血肿的措施是
A. 仰卧位 B. 保持敷料清洁、干燥 C. 托起阴囊、伤口砂袋压迫
D. 应用抗生素 E. 不可过早下床活动
- (24-26题)
- A. 腹股沟直疝 B. 腹股沟斜疝 C. 股疝 D. 切口疝 E. 腹白线疝
24. 多见于老年人的是:
25. 多见于儿童和青壮年的是:
26. 多见于中年以上妇女的是:
- (27-29题)
- A. 易复性疝 B. 难复性疝 C. 嵌顿性疝 D. 绞窄性疝 E. 滑动性疝
27. 疝块站立时出现, 平卧后消失
28. 疝块突然增大, 不能回纳, 伴有疼痛并引起肠痿
29. 疝环较小, 腹压突然增高时疝块变大, 不能回纳, 但尚未发生血运障碍

(30-31 题)

- A. 易复性疝 B. 难复性疝 C. 嵌顿性疝 D. 绞窄性疝 E. 滑动性疝
30. 可引起肠坏死
31. 平卧休息时可回纳腹腔

(32-34 题)

- A. 腹股沟斜疝 B. 腹股沟直疝 C. 股疝 D. 脐疝 E. 切口疝
32. 经直疝三角突出不进入阴囊的疝是
33. 多发生于术后数日或数月内经切口突出的
- 34 好发于婴儿的疝是

35. 胃癌最容易发生的部位是

- A. 胃前壁 B. 胃大弯 C. 胃小弯 D. 胃窦部 E. 胃底部
36. 对于胃十二指肠溃疡急性穿孔的描述哪项最重要
- A. 既往均有溃疡病史 B. 易发生在胃十二指肠前壁
- C. X 线检查膈下有游离气体 D. 确诊后应行胃大部切除术 E. 出现黑便

37. 胃大部切除术后, 最严重的并发症是

- A. 倾倒综合征 B. 吻合口梗阻 C. 术后胃出血
- D. 十二指肠残端破裂 E. 吻合口瘘

38. 诊断胃十二指肠溃疡穿孔最有意义的依据是

- A. 上腹部压痛 B. 上腹部反跳痛 C. 板状腹
- D. 腹式呼吸消失 E. 膈下游离气体

39. 溃疡病急性穿孔, 非手术治疗初期, 最重要的护理措施是

- A. 半卧位 B. 准确记录出入量 C. 应用抗生素控制感染
- D. 严密观察病情变化 E. 禁饮食, 胃肠减压, 输液

40. 胃手术后停止胃肠减压最主要的指征是

- A. 肛门排气 B. 腹胀减轻 C. 腹痛消失
- D. 胃肠减压 3d 以上 E. 肠鸣音减弱

41. 男, 35 岁。胃大部切除术后 1 周, 进食后突发腹部剧痛, 上腹饱胀, 恶心呕吐, 呕吐物为食物, 无胆汁, 最可能发生的并发症是

- A. 十二指肠残端破裂 B. 吻合口梗阻
- C. 吻合口近端空肠段梗阻 D. 吻合口远侧空肠段梗阻 E. 倾倒综合征

42. 男, 50 岁。近半年来反复出现上腹隐痛, 食欲减退, 消瘦, 粪便隐血检查持续阳性。最可能的诊断是

- A. 胃癌 B. 肺癌 C. 食管癌 D. 肝癌 E. 胃溃疡
43. 早期胃癌是指

- A. 癌肿块小于 2cm B. 癌肿仅限于浆肌层
- C. 癌肿仅限于黏膜或黏膜下层 D. 无淋巴结转移 E. 以上都不是

44. 对胃十二指肠溃疡急性大出血的非手术治疗护理, 下列哪项措施不妥

- A 定时观察脉搏、血压 B 记录呕血或便血量
- C 快速输血, 使血压高于正常值 D 卧床休息 E 暂禁食

45. 溃疡病幽门梗阻病人的主要临床表现
A. 腹胀 B. 食欲减退 C. 营养不良 D. 阵发性腹痛 E. 呕吐大量宿食
46. 十二指肠溃疡好发部位为:
A. 十二指肠球部 B. 降部 C. 水平部
D. 升部 E. 十二指肠空肠曲
- A. 胃体部 B. 贲门处 C. 幽门处 D. 胃大弯处 E. 胃小弯处
48. 某患者胃大部毕 II 式手术术后 5d, 突发右上腹剧痛, 伴有腹膜刺激征, 应考虑:
A. 十二指肠残端破裂 B. 术后胃出血 C. 吻合口梗阻
D. 空肠输入段梗阻 E. 倾倒综合征
49. 胃大部切除后, 最早易出现的并发症是
A. 倾倒综合征 B. 吻合口瘘 C. 上消化道出血
D. 低血糖综合征 E. 十二指肠残端破裂
50. 胃十二指肠溃疡急性大出血的主要表现是
A. 腹肌紧张不明显 B. 呕血或黑便 C. 上腹部轻压痛
D. 肠鸣音减弱或消失 E. 腹部轻度膨胀
51. 毕 II 式胃大部切除术后最严重的并发症是 。
A. 十二指肠残端瘘 B. 吻合口出血 C. 吻合口梗阻
D. 倾倒综合征 E. 碱性反流性胃炎
52. 胃癌最常见的转移方式是
A 直接蔓延 B 血行转移 C 淋巴转移 D 种植转移 E 沿肠管转移
53. 胃大部切除术后输出段梗阻, 呕吐物多是
A. 胆汁、不含食物 B. 食物和胆汁 C. 只有食物不含胆汁
D. 粪性呕吐物 E. 血性呕吐物
54. 消化性溃疡最常见的并发症是
A. 出血 B. 穿孔 C. 幽门梗阻 D. 癌变 E. 电解质紊乱
55. 溃疡穿孔修补术后 7 天, 体温持续 39℃, 大便次数增多, 伴里急后重, 应考虑
A. 膈下脓肿 B. 肠间脓肿 C. 盆腔脓肿
D. 粘连性肠梗阻 E 直肠癌
56. 某女 44 岁, 胃溃疡穿孔合并急性弥漫性腹膜炎, 手术后 5 天体温 39℃, 每日大便次数 7-8 次, 有排不完感, 下列哪项可能性最大
A. 肠炎 B. 细菌性痢疾 C. 肠粘连 D. 盆腔脓肿 E. 肠间隙脓肿
57. 女, 52 岁, 胃大部切除术后 4 天, 尿频、尿痛、和腰痛, 体温 39℃。目前未感到切口疼痛, 无咳嗽、咳痰。应考虑为
A. 切口感染 B. 肺部感染 C. 尿路感染 D. 腹腔感染 E. 吻合口瘘
- (58-59 题)
- 病人男性 38 岁, 诊断为消化性溃疡 2 年, 近日伴频繁呕吐, 呕吐物中含隔夜食物
58. 该病人最可能的并发症是
A. 上消化道出血 B. 穿孔 C. 幽门梗阻 D. 癌变 E. 肝性脑病
59. 下列护理措施不正确的是
A. 禁食 B. 胃肠减压 C. 限制液体的摄入

D. 观察呕吐量、性质、气味 E. 准确记录出入量

(60-62 题)

王某,男,62岁。以“排血便半月余”为主诉入院。患者于半月前不明原因出现大便次数增多,里急后重,排出污秽血便,排便时无疼痛。患者自觉食欲减退,逐渐消瘦,无恶心、呕吐。

60. 该病人应首先考虑

A 胃癌 B 结肠癌 C 直肠癌 D 肝癌 E 直肠息肉

61. 为早期诊断本病应特别强调进行的一项简单而重要的检查是

A B超 B 腹部CT C 腹部平片 D 内镜检查 E 直肠指诊

62. 该病人术后常见的护理诊断是

A 自我形象紊乱 B 腹痛 C 体温升高
D 体液不足 E 以上都不是

(63-65 题共用)

A. 呕吐咖啡样物 B. 呕吐鲜红血液 C. 呕吐胆汁
D. 呕吐酸臭宿食 E. 呕吐食物,不含胆汁

63. 胃、十二指肠溃疡术后吻合口出血

64. 胃、十二指肠溃疡术后吻合口梗阻

65. 胃、十二指肠溃疡瘢痕性幽门梗阻

66. 阑尾切除术后指导病人早期下床活动的主要目的是预防:

A. 肠粘连 B. 肺不张和肺部感染 C. 血栓性静脉炎 D. 尿潴留 E. 出血

67. 有关急性阑尾炎的体征错误的是

A. 腰大肌征(+)示阑尾尖端朝后 B. 闭孔肌征(+)示阑尾尖端朝下
C. 直肠指检压痛示阑尾尖端进入盆腔 D. 结肠充气气试验(+)
E. 反跳痛出现示炎症仅累及脏层腹膜

68. 急性阑尾炎最重要的体征是

A. 右下腹固定性压痛 B. 右下腹肌紧张 C. 发热,白细胞增高
D. 右下腹反跳痛 E. 右下腹包块

69. 急性阑尾炎的典型腹痛表现为

A. 转移性右下腹痛 B. 阵发性钻顶样绞痛 C. 持续性疼痛阵发性加重
D. 腹痛向右肩背部放射 E. 腹痛放射至会阴部

70. 急性阑尾炎非手术治疗期间,体温升高,全腹疼痛,腹肌紧张,其病情判断为

A 并发腹腔脓肿 B 阑尾穿孔腹膜炎 C 阑尾坏疽
D 并发门静脉炎 E 形成阑尾周围脓肿

71. 有明显腹膜刺激征的疾病是

A. 肾结石 B. 急性胆囊炎 C. 输尿管结石
D. 急性阑尾炎穿孔 E. 不完全性肠梗阻

72. 典型的急性阑尾炎腹痛的开始部位是

A. 右下腹 B. 左下腹 C. 脐周 D. 右上腹 E. 左上腹

73. 急性阑尾炎的主要临床症状是

- A. 转移性右下腹痛 B. 畏寒发热
C. 恶心呕吐 D. 食欲下降 E. 腹泻或便秘
74. 坏疽性阑尾炎出现高热、寒战、黄疸时要注意
A. 门静脉炎 B. 膈下脓肿 C. 急性梗阻性化脓性胆管炎
D. 急性溶血反应 E. 阑尾周围脓肿
75. 护理阑尾切除术后病人，第一天应注意观察的并发症是
A. 内出血 B. 盆腔脓肿 C. 肠粘连 D. 门静脉炎 E. 切口感染
76. 男性，25岁，诊断为化脓性阑尾炎。患者出现腹肌紧张，说明炎症刺激了
A. 阑尾肌层 B. 阑尾腔粘膜 C. 脏层腹膜 D. 壁层腹膜 E. 盲肠
77. 女，20岁。恶心，呕吐，上腹部疼痛数小时后转为右下腹痛。查：体温 38.5℃，右下腹有固定压痛点，有腹肌紧张及反跳痛。WBC： $16 \times 10^9/L$ ，首先考虑诊断是
A. 急性阑尾炎 B. 急性胆囊炎 C. 弥漫性腹膜炎
D. 急性化脓性胆管炎 E. 胃、十二指肠穿孔
78. 李某，32岁，与朋友聚餐后突发上腹部剧烈疼痛，体检发现腹部膨隆，上腹压痛明显，有反跳痛和腹肌紧张，下列处理不妥的是
A. 禁食 B. 应用哌替啶止痛 C. 应用抗生素控制感染
D. 静脉输液 E. 禁饮
79. 白先生，32岁，既往有胃病史，近一周来，常感上腹部不适，4h前突发上腹部剧烈疼痛，伴有恶心、呕吐，查体：腹部压痛、肌紧张，肝浊音界缩小，X线检查可见膈下游离气体，首先考虑
A. 急性阑尾炎穿孔 B. 胆囊炎穿孔 C. 急性胰腺炎
D. 溃疡病穿孔 E. 急性肠梗阻
80. 刘某，男，35岁，患急性阑尾炎并弥漫性腹膜炎，行阑尾切除术后4天，体温 39℃，WBC↑、下腹胀痛，排粘液便，有里急后重，最可能发生
A. 阑尾周围脓肿 B. 肠间脓肿 C. 盆腔脓肿
D. 膈下脓肿 E. 阑尾残株炎
- 男，15岁，急性阑尾炎切除后12h，腹痛未见减轻，烦躁不安，未排小便。体格检查：体温 36.8℃，脉搏 110次/min，呼吸 24次/min，血压 80/60mmHg。面色较苍白，皮肤湿冷，稍腹胀，肠鸣音减弱。
81. 该病人目前情况应考虑，可能为
A. 术后疼痛所致 B 术后尿潴留 C 术后肠麻痹
D 术后内出血 E 术后肠粘连
82. 为明确诊断，以下最好的选择措施是
A 密切观察病情 B 腹部 B超 C 腹部 X线透视
D 诊断性腹腔穿刺 E 血象检查
83. 诊断明确后应采取的治疗方法是
A 镇静 止痛 B 持续胃肠减压 C 输液 输血
D 剖腹探查 E 应用抗生素

(84—86题)

- A. 腹膜刺激征 B. 腰大肌征阳性 C. 闭孔肌征阳性
D. 结肠充气征阳性 E. Murphy 征
84. 先用一只手压迫左下腹结肠区，再用另一手按压其上方，引起右下腹疼痛
85. 患者左侧卧位，左腿屈曲，被动过伸右腿，引起右下腹疼痛
86. 患者仰卧位，使右髋屈曲 90° 并内旋，引起右下腹疼痛
87-91 题
- A. 急性阑尾炎并发盆腔脓肿 B. 肠后位阑尾炎
C. 高位阑尾炎 D. 低位阑尾炎
E. 急性阑尾炎
87. 腰大肌试验阳性提示
88. 结肠充气试验阳性提示
89. 闭孔内试验阳性提示
90. 直肌指诊，触及痛性肿块提示
91. 有转移性疼痛且痛点在麦氏点上方的提示
92. 明确为肠梗阻后，极为重要的是了解
A. 梗阻时间 B. 梗阻原因 C. 梗阻部位 D. 梗阻程度 E. 有无肠绞窄
92. 最常发生肠套叠的年龄是
A. 2岁以内 B. 2-3岁 C. 3-4岁 D. 4-5岁 E. 5-6岁
93. 绞窄性肠梗阻的腹痛特点是
A 剧烈腹痛 B 阵发性腹痛
C 放射性腹痛 D 持续性腹痛，阵发性加剧 E. 绞痛
94. 男性，18岁，饭后剧烈运动后突然出现剧烈腹痛，向腰背部放射，呕吐、应考虑为
A. 肠扭转 B. 肠套叠 C. 肠粘连 D. 肠肿瘤 E. 肠系膜动脉栓塞
95. 小儿肠套叠大便的特点是
A. 血样便 B. 果酱样便 C. 粘液便 D. 柏油样便 E. 陶土样便
96. 高位小肠梗阻除腹痛外最主要症状是
A. 腹胀明显 B. 呕吐频繁 C. 叩诊呈鼓音 D. 停止排便排气 E. 腹部包块
97. 肠梗阻时，胃肠减压的液体为血性时，首先考虑
A 并发溃疡出血 B 并发胆道出血 C 胃肠减压管刺破胃黏膜
D 凝血机制的障碍 E 肠管绞窄坏死
98. 肠梗阻病人经过治疗，梗阻解除的主要标志是
A 腹痛减轻 B 呕吐物减少 C 腹胀减轻 D 肛门排气 E 肠鸣音亢进
99. 下列绞窄性肠梗阻的临床表现，错误的是
A. 持续性腹痛，逐渐加重 B. 病情发展迅速，早期出现休克
C. 腹膜刺激症状 D. 腹胀不对称 E. 阵发性腹痛，腹胀对称
100. 绞窄性肠梗阻的表现不包括
A 持续性剧烈腹痛 B 呕吐带臭味的粪样物 C 腹膜刺激征
D 触及有固定压痛的包块 E 腹腔穿刺抽出血性液
101. 高位肠梗阻的特点是

- A. 腹胀明显 B. 呕吐出现早、频繁
C. 呕吐物有粪臭 D. 排果酱样便 E. 肛门停止排便出现早
102. 最易发生绞窄性肠梗阻的病情是
A. 肠扭转 B. 肠粘连 C. 肠壁肿瘤 D. 肠道内异物 E. 肠麻痹
103. 观察肠梗阻病人，如发现腹部出现固定性压痛及腹膜刺激征时，提示肠梗阻性质为
A. 痉挛性 B. 麻痹性 C. 粘连性 D. 绞窄性 E. 单纯性
104. 乙状结肠扭转多见于
A. 长期负重者 B. 习惯性便秘者 C. 排尿困难者
D. 晚期妊娠者 E. 饱餐后剧烈运动
105. 单纯性肠梗阻非手术治疗的主要措施是
A. 应用解痉剂解除肠痉挛 B. 应用抗生素预防感染 C. 灌肠
D. 胃肠减压与纠正体液失衡 E. 口服缓泻剂
106. 患儿，男，8个月，阵发性的哭闹，进乳后即呕吐，曾有果酱样便一次，中上腹明显肌紧张，可触及1.5-3.0cm压痛性肿物，应考虑
A. 急性肠炎 B. 肠套叠 C. 腹腔肿瘤 D. 肠扭转 E. 阑尾炎
107. 男性患者，79岁。近1周来未曾排便，感腹胀，轻度腹痛，自用开塞露无效，来院就诊。以往有便秘史约25年。查体：腹部膨隆，有肠型和蠕动波，全腹无明显压痛，左下腹可扪及条块状物，质硬，可推动，无移动性浊音，肠鸣音亢进。最可能的诊断是
A. 乙状结肠扭转 B. 肠蛔虫堵塞 C. 肠粪块堵塞
D. 乙状结肠癌 E. 肠套叠
- (108-110题)
- A. 肠梗阻 B. 胃溃疡 C. 十二指肠溃疡 D. 急性胆囊炎 E. 急性阑尾炎
108. 的典型症状是转移性右下腹痛
109. 的典型症状是餐后3-4h后出现上腹痛,进餐后缓解
110. 的典型症状是肛门停止排便排气
- (111-112题)
- A. 呕吐物为血性液 B. 呕吐物为胆汁 C. 呕吐物为粪样液
D. 呕吐物为宿食 E. 呕吐物为血液
111. 单纯性低位肠梗阻
112. 绞窄性肠梗阻
113. 直肠癌术前护理最重要的是
A. 充分的肠道准备 B. 术日晨放置尿管及胃管 C. 输血以纠正贫血
D. 高热量、高蛋白饮食 E. 备皮
114. 直肠癌早期诊断最简便易行的方法是
A. 钡灌肠X线检查 B. B超 C. 直肠指诊
D. 血生化检查 E. 直肠镜及乙状结肠镜检查
115. 疑为直肠癌的患者，首先应做的检查是
A X线钡灌肠摄片 B乙状结肠镜 C腹部B超
D大便细菌培养 E直肠指检

116. 大肠癌病人术前肠道准备时，需给病人补充
A. 维生素 A B. 维生素 C C. 维生素 E D. 维生素 K E. 维生素 B
117. 结肠癌好发于
A 盲肠 B 升结肠 C 降结肠 D 横结肠 E 乙状结肠
118. 结肠癌最早出现的症状是
A. 排便习惯及粪便性状改变 B. 腹痛 C. 腹部包块
D. 肠梗阻症状 E. 全身中毒症状
119. 结肠癌术前准备中不正确的是
A 术前 3 天流质饮食 B 术前 3 天口服肠道吸收的抗生素
C 术前清洁灌肠 D 术前应用维生素 K E 术前 1-2 天口服液体石蜡
120. 男，50 岁，1 个月来经常大便带少量鲜血和粘液，大便习惯改变，外观无痔核脱出。检查宜首选：
A. 直肠指检 B. 直肠镜 C. 肛门镜
D. 纤维结肠镜 E. 钡灌肠造影
121. 内痔一般好发生在哪些点钟
A. 胸膝位 3、7、9 点钟处 B. 膝胸位 3、7、11 点钟处
C. 截石位 3、6、9 点钟处 D. 膝胸位 3、6、9 点钟处
E. 截石位 3、7、11 点钟处
122. 肛裂最易发生的部位是
A. 肛管前正中线上 B. 肛管后正中线上 C. 肛管两侧
D. 齿状线以上 E. 齿状线以下
123. 对重病体弱的病人检查肛门直肠最合适时的体位是
A. 蹲位 B. 弯腰前俯位 C. 膝胸位
D. 截石位 E. 左侧卧位
124. 关于肛门坐浴的作用，下列哪一项是错误的
A. 能增进局部血运 B. 促进炎症吸收 C. 缓解肛门括约肌痉挛
D. 清洁作用 E. 有止血作用
125. 排便时及排便后剧烈疼痛，粪便表面带少量鲜血，应考虑为
A I 期内痔 B. II 期内痔 C. 血栓性外痔 D. 肛裂 E. 直肠息肉
126. 适用于肛门手术的体位
A. 蹲位 B. 截石位 C. 左侧卧位 D. 膝胸位 E. 右侧卧位
127. 内痔的早期症状是
A. 痔块脱出 B. 疼痛 C. 便秘 D. 便血 E. 分泌黏液
128. 直肠肛管手术后最常见的并发症是
A. 伤口出血 B. 大便失禁 C. 肛门狭窄 D. 切口感染 E. 切口裂开

(129-131 题)

男性，70 岁，较长时间大便干燥，近 2 周来，排便时疼痛伴出血，经检查，肛管皮肤全层裂开，形成溃疡，诊断为肛裂，采用坐浴等非手术治疗。

129. 该患者做直肠肛管检查时最合适的体位是

- A 蹲位 B 左侧卧位 C 右侧卧位 D 膝胸位 E 截石位
130. 该患者肛门坐浴的水温应为
A. 20-26℃ B. 30-36℃ C. 40-43℃ D. 50-56℃ E. 60-66℃
131. 上述患者的有关处理哪项不妥
A 避免辛辣食物 B 少吃水果 C 服缓泻剂
D 避免肛门指检 E 外用消炎软膏
132. 男性, 24 岁, 2 天前肛门周围持续性跳痛, 皮肤硬结红肿, 并有局部压痛, 可能出现了
A. 肛裂 B. 内痔 C. 外痔 D. 直肠脱垂 E. 肛门周围脓肿
133. 下列哪一种情况不宜做直肠指检?
A. 内痔出血 B. 直肠脱垂 C. 肛裂 D. 外痔 E. 复杂性肛痿
134. 肛裂的主要特点是
A. 无痛性便血 B. 肛门部下坠感 C. 疼痛性便血
D. 肛门有脓性分泌物 E. 经常有稀便
135. 人工肛门的病人护理, 不妥当的是
A 左侧卧位 B 保护腹部切口不再污染 C 用氧化锌软膏保护瘻口周围皮肤
D 肛袋用后洗净, 消毒 E 肛袋应坚持长期使用
136. 中年人便血及排便习惯改变首先进行的检查是
A. 纤维结肠镜 B. 钡灌肠 C. 直肠镜检 D. 直肠指检 E. 大便常规
137. 内痔早期常见症状是
A 肛门疼痛 B 便时带血 C 痔核脱出 D 便秘 E. 以上说法都正确
138. 下列肛裂的临床表现不正确的是
A 疼痛 B 便秘 C 出血 D 肿块脱出 E 前哨痔
139. 肛管直肠周围脓肿最常见的原因是
A 直肠炎 B 肛窦炎 C 肛裂 D 外伤 E 肛痿
140. 直肠肛管检查时最常用的体位是
A 侧卧位 B 膝胸位 C 截石位 D 蹲位 E 平卧位
141. 关于肛门坐浴, 错误的是
A 准备清洁专用坐浴盆 B 用 0.2%高锰酸钾溶液 C 水温 40℃-50℃
D 每次 15-20min E 用 0.02%高锰酸钾溶液
142. 男, 35 岁, 肛门附近皮肤反复破溃溢脓达 2 年余, 体检发现右侧距肛门约 4cm 处有一乳头状突起, 挤压后有少许脓液排出. 最可能的诊断是
A 肛周脓肿 B 内痔 C 肛痿 D 直肠肿瘤 E 肛裂
143. 混合痔是指
A. 两个以上内痔 B. 两个以上外痔 C. 内外痔同时存在
D. 内痔多发, 形成环状痔 E. 直肠上下静脉丛彼此相通形成的痔
144. 男性, 25 岁, 上腹部刀割样疼痛 2h, 渐蔓延至全腹. 查体: 全腹压痛, 伴反跳痛及肌紧张, 肠鸣音消失, 肝浊音界缩小. 既往无溃疡病史. 以下处理错误的是:
A. 密切观察病情变化 B. 取半卧位 C. 禁食、胃肠减压

- D. 使用止痛药物 E. 做好术前准备
145. 排便时及排便后有两次疼痛高峰的是
A. 肛裂 B. 外痔 C. 肛痿 D. 直肠脱垂 E. 直肠肛管周围脓肿
(146-150 题)
- A. 便时出血，无痔块脱出和疼痛
B. 便时出血，痔块脱出于肛门，便后自行回纳
C. 便时出血，痔块脱出于肛门，不能自行回纳
D. 肛门部疼痛，局部可见暗紫色肿块
E. 便时出血，便时便后肛门疼痛剧烈
146. I 期内痔的表现 147. II 期内痔的表现
148. III 期内痔的表现 149. 血栓性外痔的表现
150. 肛裂的表现

第十六章 肝胆疾病病人的护理

1. 对诊断原发性肝癌具有较高特异性的检查是
A. 放射性核素肝扫描 B. B 超 C. CT
D. 选择性肝动脉造影 E. 血清甲胎蛋白测定
2. 原发性肝癌病人常见首发症状是
A. 肝区疼痛 B. 肝区肿大 C. 消瘦乏力 D. 腹水 E. 以上都不是
3. 原发性肝癌肝区疼痛特点是
A 间歇性隐痛 B 持续性胀痛 C 阵发性绞痛
D 刀割样疼痛 E 烧灼样疼痛
4. 对原发性肝癌，早期诊断最有意义的是：
A. 肝脏肿大 B. 肝功能异常 C. AFP 测定
D. 消瘦 E. 大便隐血试验 (+)
5. 原发性肝癌最主要的转移部位是：
A. 肝内 B. 肺 C. 左锁骨上淋巴结 D. 骨 E. 腹腔内种植
6. 男性，40 岁，已确诊晚期肝癌。突然右上腹疼痛，面色苍白，大汗。最可能发生的情况是：
A. 急性胆囊炎 B. 心肌梗塞 C. 肝癌破裂
D. 急性阑尾炎 E. 十二指肠溃疡穿孔
7. 通过甲胎蛋白可诊断的是
A 前列腺癌 B 大肠癌 C 骨肿瘤 D 原发性肝癌 E 乳癌
8. 门静脉高压症的临床表现是
A. 肝大、呕血、腹水 B. 肝大、腹水、黄疸 C. 脾大、肝掌、蜘蛛痣
D. 肝大、肝掌、蜘蛛痣 E. 脾大、呕血、腹水
9. 门静脉高压症最危急的并发症是
A. 上消化道出血 B. 肝性脑病 C. 脾功能亢进 D. 腹水 E. 凝血障碍
10. 关于门静脉高压症的术后护理，下列哪项是错误的
A. 定期监测生命体征 B. 观察腹腔引流液的性质及颜色

- C. 分流术后应取半坐卧位 D. 卧床 1 周 E. 观察病人有无意识改变
11. 关于门静脉高压症分流术后护理, 错误的是
A. 早期起床活动 B. 低蛋白饮食 C. 应用抗生素
D. 禁忌过烫食物 E. 术后平卧 48h
12. 门静脉高压症病人禁食粗糙辛辣食物的目的是
A. 避免诱发肝性脑病 B. 避免诱发上消化道出血
C. 减少腹水形式 D. 减少胃肠道刺激 E. 以上都不对
13. 手术治疗门静脉高压症合并食管静脉曲张的最主要的目的是
A. 降低门静脉的压力 B. 预防上消化道出血
C. 提高抵抗力 D. 减轻腹水 E. 防止肝功能衰竭
14. 门静脉高压症患者, 术后康复期护理中哪项不妥:
A. 保证足够的休息, 避免劳累和较重的体力劳动 B. 忌烟酒
C. 心情乐观愉快 D. 避免粗糙, 过热, 刺激性强的食物
E. 定期高压氧治疗
15. 门静脉高压症病人分流术的最主要缺点是
A. 手术难度大 B. 易发生血栓 C. 不能减轻腹水
D. 易诱发肝性脑病 E. 不能纠正脾功能亢进
16. 门脉高压在我国的主要原因是
A 肝炎后肝硬化 B 血吸虫性肝硬化 C 胆汁性肝硬化
D 门静脉血栓形成 E 酒精性肝硬化
17. 门静脉高压症手术前准备, 下列哪项是错误的
A. 保肝治疗 B. 无渣高糖饮食 C. 输新鲜血液
D. 肌注维生素 K E. 手术当日放置胃管
18. 门静脉与腔静脉之间的交通支中最有临床意义的是
A. 腹膜后交通支 B. 腹壁交通支 C. 直肠肛管交通支
D. 食管胃底交通支 E. 以上都不是
- (19-20题)
- A. 尽量卧床休息, 节省精力和能量 B. 不宜过早下床活动
C. 手术当日放置胃管 D. 禁食 E. 可以使用有损肝脏的药物
19. 哪项是关于门静脉高压症的分流术后护理:
20. 哪项是门静脉高压症的术前护理:
21. 胆道疾病首选的检查方法是
A. X线检查 B. 经皮肝穿刺胆管造影
C. 内镜逆行胰胆管造影 D. 静脉胆道造影 E. B型超声波
22. T形管引流患者护理哪项不妥
A. T形管妥善固定 B. 保持引流通畅 C. 每周更换引流瓶一次
D. 记录胆汁量及性质 E. 观察全身情况
23. 急性重症胆总管炎病人梗阻原因主要是
A. 胆管结石 B. 胆管畸形 C. 胆管肿瘤 D. 胆道狭窄 E. 胆道蛔虫

24. 在我国急性胰腺炎最常见的病因是
A. 胆道疾病 B. 腹部外伤 C. 暴饮暴食
D. 酗酒 E. 十二指肠乳头邻近部位病变
25. Charcot 三联征的典型表现出现的顺序是
A. 寒战高热、黄疸、腹痛 B. 腹痛、寒战高热、黄疸
C. 黄疸、寒战高热、腹痛 D. 寒战高热、腹痛、黄疸
E. 腹痛、黄疸、寒战高热
26. 胆道蛔虫症的临床特点是
A. 症状重、体征轻 B. 症状轻、体征重 C. 粪常规可查到蛔虫卵
D. 青少年发病率高 E. B超检查可确诊
27. 胆道手术后 T 形管引流的留置时间一般是
A. 3d B. 7d C. 10d D. 14d E. 30d
28. 胆道疾病做 B 超检查前应
A 禁食水 12h B 禁食水 4h C 禁食 12h, 禁水 8h
D 禁食 12h, 禁水 4h E 禁食 8h, 禁水 4h
29. 经皮肝穿刺胆道造影 (PTC) 术后最常见的并发症是
A 呼吸困难 B 内出血 C 胰腺炎 D 感染性休克 E 肝性脑病
30. 胆道 T 管引流和腹腔引流管的护理措施, 二者不同的是
A 保持引流管通畅 B 每天更换引流瓶 C 观察引流量和性状
D 拔管前夹管观察 1-2d E 引流瓶不得高于引流出口
31. 关于急性胆囊炎的临床特点的描述错误的是
A. 进油腻饮食后, 容易发病 B. 右上腹持续性疼痛, 阵发性加重
C. 疼痛常放射至右肩背部 D. 墨菲征阳性 E. 多数病人伴有黄疸
32. 急性重症胆管炎病人的治疗原则是:
A. 抗感染治疗 B. 胆囊造瘘+抗休克 C. 内引流术+抗感染
D. 抗休克+胆总管切开引流 E. 抗休克治疗
33. 观察 T 管引流的胆汁, 哪项表示胆总管下端有阻塞可能:
A. 胆汁混浊 B. 胆汁量过多 C. 胆汁量过少, 色深
D. 胆汁量少而色淡 E. 胆汁棕色稠厚
34. 胆道蛔虫症的疼痛特点为:
A. 阵发性绞痛 B. 持续性腹痛 C. 持续性绞痛
D. 刀割样腹痛 E. 钻顶样剧烈疼痛
35. 胆石症的病人出现胆绞痛时禁用
A. 阿托品 B. 硫酸镁 C. 吗啡 D. 654-2 E. 安定
36. 胆道 T 型管护理哪项不妥
A. 妥善固定 B. 经常挤捏防止堵塞 C. 每日行加压冲洗
D. 每日更换接管和瓶 E. 每日记录引流量和性质
37. 下列胆道 T 管的护理, 哪项不妥
A. 妥善固定 B. 保持通畅 C. 每日按时冲洗

- D. 每日更换引流瓶 E. 记录引流量和性质
38. 治疗胆道感染休克的关键是
A. 大量抗生素 B. 扩充血容量
C. 大量皮质激素 D. 纠正电解质酸碱平衡紊乱
E. 抗休克手术切开、减压引流
39. 以下与急性胆囊炎不符的是
A 常在进食油腻食物后发生 B 主要表现为右上腹剧痛
C 主要体征为莫非征阳性 D B超检查示胆囊变大
E B超检查示胆囊变小
40. 有关胆道蛔虫症的描述错误的是
A 常有胆道蛔虫病史 B 发作时剑突下“钻顶样”剧痛
C 间歇期腹痛可完全消失 D 症状和体征相符 E 好发于8岁左右的儿童
41. 墨菲氏征阳性提示
A. 急性胆管炎 B. 细菌性肝脓肿 C. 急性胆囊炎
D. 胆总管结石 E. 肝内胆管结石

第十八章 周围血管疾病病人的护理

1. 下肢静脉曲张的主要原因是
A. 心脏功能不全 B. 静脉瓣膜破坏 C. 下肢肌肉收缩减退
D. 皮下脂肪减少 E. 胸腔负压作用减低
2. 下肢静脉曲张剥脱术后护理，正确的是：
A. 卧床休息10天 B. 患肢制动 C. 只允许床上活动
D. 早期下床活动 E. 一周后方可行走
3. 下肢静脉曲张的主要原因是
A. 心脏功能不全 B. 静脉瓣膜功能不全 C. 下肢肌肉收缩减退
D. 皮下脂肪减少 E. 胸腔负压作用减低
4. 下肢静脉曲张剥脱术后护理，哪项正确
A 卧床休息10D B 患肢制动 C 只允许床上活动
D 早期下床活动 E 1周后方可行走
5. 大隐静脉曲张术后护理错误的是：
A. 做足趾伸屈运动 B. 弹力绷带包扎患肢 C. 术后3-4天方可下床活动
D. 患肢抬高30° E. 弹力绷带维持2周方可拆除
6. 下肢静脉曲张主要症状是：
A. 下肢沉重感 B. 溃疡形成 C. 曲张静脉破裂出血
D. 血栓性静脉炎 E. 静脉血栓形成
7. 下肢静脉曲张的主要原因是：
A. 长期站立 B. 静脉壁薄弱和静脉压增高 C. 股静脉血栓形成
D. 慢性咳嗽，习惯性便秘 E. 盆腔肿瘤
8. 决定下肢静脉曲张能否手术，主要是

- A. 检查深组静脉是否通畅 B. 浅静脉功能是否良好
C. 交通支瓣膜功能是否良好 D. 静脉曲张严重程度 E. 有无慢性溃疡
9. 男, 60 岁。患左下肢静脉曲张 20 年, 行大隐静脉高位结扎, 加小腿静脉分段结扎, 术后 3h 起立行走时, 小腿处伤口突然出血不止。紧急处理应
- A. 就地包扎 B. 指压止血 C. 用止血带 D. 钳夹止血
E. 卧平, 抬高患肢, 加压包扎
10. 下肢静脉曲张病人术后护理错误的是
- A 适当休息, 抬高患肢 B 绷带从近端向远端包扎 C 绷带包扎一般维持 2 周
D 术后 2 日即可下床活动 E 绷带从远端向近端包扎
11. 血栓闭塞性脉管炎早期特有的临床表现是
- A. 趾端坏死 B. 休息痛 C. 间歇性跛行
D. 营养性改变 E. 足背动脉搏动消失
12. 确诊下肢静脉疾病最可靠的方法是
- A. CT B. B 超 C. 静脉造影
D. 深静脉回流试验 E. 交通支瓣膜功能试验
13. 血栓闭塞性脉管炎局部缺血期可出现
- A. 休息痛 B. 小腿溃疡 C. 干性坏疽 D. 肌肉萎缩 E. 间歇性跛行
14. 下列哪项不是血栓闭塞性脉管炎的病因
- A. 长期大量吸烟 B. 气候寒冷、潮湿 C. 神经内分泌紊乱
D. 下肢活动减少 E. 免疫功能异常
15. 胡女士, 50 岁, 化脓性胆管炎手术后 10 天, 多次下肢静脉输液并发血栓性静脉炎, 下列措施哪项禁忌
- A. 停止在患处静脉输液 B. 抬高患肢 C. 局部制动
D. 局部按摩 E. 局部硫酸镁湿热敷
16. 血栓闭塞性脉管炎的主要病变部位是
- A. 四肢大血管 B. 股动脉、腘动脉
C. 腋动脉、肱动脉 D. 四肢中小动脉, 以下肢为主
E. 四肢中小静脉, 以上肢为主
17. 不是**血栓**闭塞性脉管炎症状的是:
- A. 静息痛 B. 间歇性发作的突发性疼痛 C. 活动时有时间歇痛
D. 对寒冷敏感性增加 E. 局部皮肤颜色变化
18. 血栓闭塞性脉管炎营养障碍期的特征性的表现是
- A. 间歇性跛行 B. 足背静脉搏动减弱 C. 肢体坏疽
D. 游走性浅静脉炎 E. 静息痛
19. 血栓闭塞性脉管炎局部缺血期的临床表现, 不包括
- A 间歇性跛行 B 静息痛 C 足背动脉搏动减弱
D 游走性血栓性静脉炎 E 肢端发凉、麻木、酸疼

第十九章 泌尿及男性生殖系统疾病病人的护理

1. 终末血尿提示病变部位在
A. 尿道 B. 肾脏 C. 输尿管 D. 膀胱颈部以上 E. 膀胱颈部
2. 尿三杯试验的结果为第一杯异常, 提示病变部位可能是
A. 前尿道 B. 后尿道 C. 膀胱
D. 膀胱以上 E. 膀胱三角区
3. 膀胱镜检查后病人出现血尿和疼痛, 处理不妥当的是:
A. 给止痛药 B. 给镇静、安定药 C. 嘱少饮水、减少排尿
D. 卧床休息 E. 用抗生素
4. 泌尿外科术后病人护理, 错误的护理措施是:
A. 保持尿液引流通畅 B. 使用留置尿管者要保持引流装置无菌
C. 伤口敷料渗湿后要及时更换
D. 手术切口留置的引流物一般于术后 24—48h 取出
E. 为减少尿液污染伤口, 应尽量少饮水
5. 膀胱镜检查后病人出现血尿和疼痛, 处理不妥的是
A. 给止痛药 B. 给镇静、安定药 C. 嘱少饮水, 减少排尿
D. 卧床休息 E. 用抗生素
6. 膀胱刺激征是指
A. 尿量增多, 尿失禁 B. 排尿困难, 尿痛
C. 尿急, 尿痛 D. 尿频, 夜尿增多 E. 尿频, 尿急, 尿痛
7. 一位产妇由于大笑不止, 尿液不随意流出, 属于:
A. 真性尿失禁 B. 压力性尿失禁 C. 充溢性尿失禁
D. 急迫性尿失禁 E. 以上都不是
8. 全程血尿提示病变部位位于
A. 前尿道 B. 后尿道
C. 膀胱颈部 D. 膀胱三角区 E. 肾脏、输尿管
9. 膀胱破裂的简便方法是
A 腹部叩诊 B. B 超检查 C 耻骨上膀胱穿刺
D 导尿管膀胱注水试验 E 腹部触诊
10. 肾部分切除术后, 不正确的护理方法是
A. 早期下床活动 B. 术后注意生命体征的变化 C. 绝对卧床休息
D. 术后适当镇痛 E. 注意引流管的护理
11. 肾损伤后下列哪项护理是错误的
A. 绝对卧床休息 2—4 周 B. 早期下床活动
C. 保持排尿通畅 D. 应用抗生素防止感染 E. 观察生命体征的变化
12. 肾损伤非手术治疗需绝对卧床休息的时间为 周
A. 1—2 B. 2—3 C. 2—4 D. 3—4 E. 3—5
13. 尿道损伤后最易造成的并发症是
A. 尿道狭窄 B. 尿瘘 C. 尿道周围脓肿
D. 尿失禁 E. 性功能障碍

13. 男, 20 岁。从 3 米高处跌下, 骑跨于木杆上, 经检查阴茎、会阴和下腹壁青紫肿胀, 排尿困难, 尿道口滴血。应考虑为
A 会阴部挫伤 B 下腹部挫伤 C 前尿道损伤 D 后尿道损伤 E 膀胱损伤
14. 肾损伤非手术疗法护理应除外
A. 防治休克 B. 密切观察 C. 应用止血剂, 止痛和镇静剂
D. 抗感染治疗 E. 尿转清后即可下床活动
15. 男性骑跨伤所致的尿道断裂多发生在
A. 海绵体部 B. 球部 C. 膜部 D. 前列腺部 E. 膀胱颈部
16. 属于膀胱结石的典型症状是
A. 尿频、尿急 B. 排尿中断 C. 血尿 D. 脓尿 E. 尿潴留
17. 尿结石引起血尿的病理生理基础是
A. 梗阻引起 B. 直接损伤引起 C. 剧烈疼痛引起
D. 剧烈运动的结果 E. 大量出汗后, 尿液浓缩
18. 8 岁男孩在排尿途中, 突然尿流中断, 叫痛不已, 应首先考虑
A. 尿道结石 B. 膀胱结石 C. 肾结石 D. 输尿管结石 E. 肾盂结石
19. 输尿管结石的主要症状是:
A. 无痛性全程血尿 B. 肾绞痛加镜下血尿 C. 尿痛、尿频
D. 排尿困难 E. 尿失禁
20. 肾、输尿管结石最突出的表现
A. 疼痛 B. 血尿 C. 肿块 D. 休克 E. 感染
21. 男, 40 岁。诊断为右侧输尿管结石, 结石大小约为 1.5cm, 最佳的治疗方案是
A. 服排石药物 B. 手术治疗 C. 不处理, 观察
D. ESWL E. 多饮水, 促进排出
22. 肾结石引起肾绞痛时, 应首先采用的方法是
A. 应用抗生素 B. B 超检查
C. X 线摄片检查 D. 解痉止痛 E. 急诊手术治疗
23. 上尿路结石最常见的结石类型是
A. 胱氨酸结石 B. 草酸钙结石 C. 磷酸镁铵结石
D. 尿酸结石 E. 碳酸钙结石
24. 双侧输尿管结石导致的急性肾衰竭属于
A. 肾前性 B. 肾后性 C. 肾性 D. 上述均不对 E. 上述均正确
25. 下列哪项不是 ESWL 的并发症
A. 肾绞痛 B. 血尿 C. 石街 D. TUR/P 综合征 E. 发热
26. 下列哪项是 ESWL 后的护理措施
A. 多饮水 B. 适当活动 C. 扣击背部 D. 患侧卧位 E. 以上均是
27. 前列腺增生最早出现的症状是
A. 排尿困难 B. 尿频、夜尿次数增多明显 C. 血尿 D. 尿潴留 E. 尿痛
28. 前列腺增生最重要的症状是
A. 尿频 B. 进行性排尿困难 C. 尿失禁 D. 尿储留 E. 尿流中断

29. 老年男性尿潴留最常见的原因是
A. 尿道狭窄 B. 膀胱结石 C. 膀胱肿瘤 D. 前列腺增生 E. 膀胱结核
30. 前列腺切除术后护理的重点是
A. 观察和防治出血 B. 防止感染 C. 防止尿道狭窄
D. 防止血栓形成 E. 防止尿失禁
31. 一男性老年患者, 半年来夜间尿频, 有排尿不尽感, 尿液变细, 排尿时间延长, 排尿困难逐渐加重。近两天排尿时有下腹部疼痛。考虑为:
A 膀胱癌 B 肾结核 C 慢性膀胱炎
D 前列腺增生 E 膀胱及尿道结石
32. 肾结核最早出现的症状是
A. 消瘦 B. 血尿 C. 低热、盗汗 D. 肾区肿块 E. 尿频
- 男, 56岁。泌尿系统反复感染, 尿频、尿急明显, 诊断为右肾结核。
(33-35 题)
A. 无痛性肉眼血尿 B. 肾绞痛伴血尿 C. 血尿伴反复膀胱刺激征
D. 外伤后血尿 E. 血尿伴水肿、高血压
33. 泌尿系结石
34. 泌尿系损伤
35. 泌尿系结核
(36-40 题)
A 骑跨伤 B 枪弹、锐器伤 C 骨盆骨折
D 腰部撞击伤 E 盆腔手术或腹膜后手术
36. 尿道球部损伤多见于
37. 后尿道损伤多见于
38. 肾损伤多见于
39. 输尿管损伤多见于
40. 尿道球部损伤多见于
(41-42 题)
A 草酸盐结石 B 尿酸盐结石 C 磷酸盐结石 D 胱氨酸结石 E 黑结石
41. 临床上最常见的泌尿系结石为
42. 只可以在碱性尿中形成的是
(43-46 题)
A. 尿频 B. 排尿困难 C. 尿潴留 D. 尿失禁 E. 尿痿
43. 膀胱内尿液不能控制而随时流出:
44. 尿液经不正常通道从膀胱自行流出:
45. 膀胱内有尿液而不能排出
46. 尿液不能顺利排出

第二十章 骨与关节疾病病人的护理

1. 新鲜骨折的时间期限是伤后

- A. 3天 B. 1周 C. 2周 D. 3周 E. 4周
2. 骨折最具有诊断意义的表现是
A. 疼痛与压痛 B. 功能障碍 C. 假关节活动 D. 淤斑淤点 E. 肿胀
3. 骨折与关节脱位共有的特殊特征是：
A. 畸形 B. 异常活动 C. 骨擦音 D. 弹性固定 E. 关节空虚
4. 下列哪项不属于骨折早期并发症的
A. 休克 B. 内脏损伤 C. 关节僵硬 D. 脂肪栓塞 E. 脊髓损伤
5. 一般骨折病人不可缺少的检查是
A. 血常规检查 B. X线摄片 C. CT检查 D. B超检查 E. 局部穿刺
6. 不属于骨折专有体征的是
A. 创伤处畸形 B. 假关节活动 C. 功能障碍 D. 骨擦音 E. 骨擦感
7. 骨折的特殊表现是
A. 疼痛，肿胀，功能障碍 B. 畸形，异常活动，骨擦音或骨擦感
C. 畸形，功能障碍，异常活动 D. 肿胀，淤斑，畸形 E. 以上都不对
8. 方肩畸形可见于
A. 锁骨骨折 B. 肩关节脱位 C. 上臂严重肿胀
D. 肱骨髁上骨折 E. 肱骨外科颈骨折
9. 不完全性骨折指
A. 嵌插性骨折 B. 压缩性骨折 C. 青枝性骨折
D. 螺旋性骨折 E. 粉碎性骨折
10. 不属于骨折早期并发症的是（ ）
A. 骨化性肌炎 B. 感染 C. 内脏器官损伤 D. 脂肪栓塞 E. 休克
11. 影响骨折愈合的最主要因素是
A. 高龄 B. 伤口感染 C. 粉碎性骨折
D. 血液供应不良 E. 复位时过度牵引
12. 下列哪项属于不完全骨折
A. 裂缝骨折 B. 斜形骨折 C. 横形骨折 D. 粉碎性骨折 E. 嵌插骨折
13. 男，42岁，被汽车压伤后，右侧肢体肿胀、畸形、不能活动，病人神智清楚，面色苍白，X线片示右侧上下肢多发性骨折。此病人易发生
A 休克 B 缺血性骨坏死 C 骨折部位感染
D 泌尿系统感染 E 反常呼吸
14. 一肱骨髁上骨折病人，复位固定后不久，出现手部皮肤苍白、发凉、发麻症状。可能出现的并发症是
A 肱动脉损伤 B 肘内翻畸形 C 骨化性肌炎
D 缺血性肌挛缩（早期） E 休克
15. 哪项不是骨折的早期并发症
A. 休克 B. 感染 C. 神经损伤 D. 损伤性骨化 E. 脂肪栓塞
16. 治疗骨折最常用的方法是
A. 切开复位与内固定 B. 手法复位与外固定 C. 经皮穿针骨外固定

- D. 手法复位与内固定 E. 持续牵引
17. 闭合性骨折转运前最重要的是
- A. 伤肢固定 B. 抬高患肢 C. 使用止痛剂
D. 做好手法复位 E. 保持肢体功能
18. 疑有脊柱骨折患者应采用的搬运方法是
- A. 用软担架搬动 B. 三人平托硬板搬运 C. 二人抱持搬运
D. 一人抱持搬运 E. 一人背负搬运
19. 脊柱骨折急救搬运的基本原则是
- A. 始终保持脊柱中立位 B. 始终卧硬板转运 C. 不可背驮运送
D. 不可抱持运送 E. 不可坐位检查和运送
20. 开放性骨折最重要的治疗措施是
- A. 早期彻底清创 B. 早期使用抗生素
C. 及时使用 TAT D. 及时复位固定 E. 镇静止痛
21. 骨折现场急救, 错误的方法是
- A 重点检查有无内脏损伤 B 开放性骨折应现场复位 C 取清洁布类包扎伤口
D 就地取材、固定患侧肢体 E 正确搬移脊柱骨折病人
22. 骨折现场急救应首先处理 ()
- A. 包扎伤口 B. 固定骨折 C. 彻底清创
D. 有骨折裸露先复位 E. 制止大出血
23. 关于骨折的治疗, 下面哪项不正确
- A. 止血是骨折治疗的原则之一
B. 复位是使骨折部位恢复正常或接近正常的解剖位
C. 大多数骨折可手法复位 D. 固定的目的是使骨折部位稳定
E. 功能锻炼应循序渐进
24. 石膏或小夹板固定之后最应注意的是
- A. 松脱 B. 骨折在移位 C. 压迫性溃疡
D. 血液循环受阻 E. 石膏变形
25. 小夹板固定者的护理中不妥的是
- A. 缚夹板的带结以不能上下移动为宜 B. 注意肢体的感觉, 运动及血运
C. 抬高患肢 D. 告诉病人定时复诊 E. 可早期进行患肢功能锻炼
26. 护理石膏固定病人时, 不妥的是
- A. 固定 48h 内重点注意肢体受压症状 B. 固定期间抬高患肢
C. 常练习石膏型内肌肉舒缩活动 D. 拆除石膏型前, 应摄 x 线片
E. 拆除石膏后, 即可负重活动
27. 女性, 22 岁, 小腿行石膏绷带包扎后 1h, 出现脚趾剧痛, 苍白发凉, 足背动脉搏动减弱, 应首先采取的措施是
- A 注意保暖 B 抬高患肢 C 给予止痛药
D 做下肢被动活动 E 适当松解石膏绷带
28. 男性, 因股骨干骨折行持续骨牵引, 其护理哪项错误

- A 抬高床头 15-30cm B 每天用乙醇滴牵引针孔 C 保持有效的牵引作用
D 定时测量肢体长度 E 指导患者功能锻炼

29. 护理下肢骨牵引患者时，下列哪项是错误的

- A. 骨牵引针孔每日滴酒精 B. 牵引砝码不接触地面 C. 抬高床头 15-30cm
D. 指导病人功能锻炼 E. 定时测量患肢长度

30. 男性，20 岁，建房时肩部受撞击，局部疼痛，“方肩畸形”，将患侧肘部贴近胸壁，其手掌不能搭至健肩，应首先考虑为

- A 肩关节扭伤 B 肩部软组织损伤 C 肩胛骨骨折
D 锁骨骨折 E 肩关节脱位

31. 男性，25 岁，外伤后出现肘部关节肿胀，可以帮助鉴别肱骨髁上骨折和肘关节后脱位的表现是

- A 手臂功能障碍 B 肘部剧烈疼痛 C 是否可摸到尺骨鹰嘴
D 肘后三点失去正常关系 E 跌倒后因手掌撑地而受伤

(32-35 题)

女性，7 岁，不慎跌倒时以手掌撑地，倒地后自觉右肘上部剧烈疼痛，大哭，被立即送往医院。体检可见上臂成角畸形，轻度肿胀，肘后三角关系正常，不敢用右手取物。

32. 该患者最可能出现

- A. 肘关节脱位 B. 桡骨上端骨折 C. 尺骨上端骨折
D. 肱骨髁上骨折 E. 肘部软组织挫伤

33. 患者受伤的病因为

- A. 直接暴力 B. 间接暴力 C. 肌肉牵拉 D. 骨骼劳损 E. 骨骼疾病

34. 除了 X 线片外，做出骨折诊断的主要依据是

- A. 局部剧烈疼痛 B. 上臂成角畸形 C. 肘部轻度肿胀
D. 不敢用右手取物 E. 跌倒时以手掌撑地

35. 对该患儿的观察重点是否合并

- A. 伤口感染 B. 皮肤划伤 C. 肌腱断裂 D. 软组织损伤 E. 肱动脉损伤

(36-38 题)

- A. 直接暴力导致的骨折 B. 间接暴力导致的骨折 C. 撕脱性骨折
D. 疲劳性骨折 E. 病理性骨折

36. 肌肉拉力可以引起：

37. 积累劳损可以引起：

38. 骨组织疾患可以引起：

(39-41 题)

- A 枪刺刀畸形 B 杜加试验阳性 C 易发生骨折不愈合
D 肘后三点关系失常 E 易合并正中神经损伤

39. 肩关节脱位

40. 股骨颈骨折

41. 肱骨髁上骨折

(42-44 题)

- A. 骨折端不易移位
 - B. 复位固定后易于发生再移位的骨折
 - C. 骨的完整性和连续性部分中断
 - D. 骨的完整性和连续性完全中断
 - E. 以上都是
42. 稳定骨折是:
43. 完全骨折是:
44. 不完全骨折是:
(45-46 题)
- A. 青枝骨折 B. 横形骨折 C. 压缩骨折 D. 螺旋骨折 E. 嵌插骨折
45. 属于不稳定骨折的是
46. 属于不完全骨折的是
47. 关节脱位的特征性表现是
- A. 肿胀 B. 瘀血 C. 弹性固定 D. 疼痛 E. 活动受限
48. 关节脱位复位后, 一般需外固定
- A. 1 周 B. 2-3 周 C. 3-4 周 D. 4-5 周 E. 5-6 周
49. 肘关节后脱位的特征表现是
- A. 活动障碍 B. 肿胀及瘀血 C. 肘后三点关系失常
D. 疼痛 E. 尺神经麻痹
50. 可确诊为关节脱位的是
- A. 疼痛 B. 肿胀 C. 功能障碍 D. 瘀斑 E. 关节腔空虚
51. 引起关节脱位的原因哪项除外
- A. 创伤性脱位 B. 病理性脱位 C. 习惯性脱位
D. 劳累性脱位 E. 先天性脱位
52. 急性血源性骨髓炎最常见的致病菌是:
- A. 金黄色葡萄球菌 B. 溶血性链球菌 C. 大肠杆菌
D. 肺炎球菌 E. 绿脓杆菌
53. 急性血源性骨髓炎多见于
- A. 骨折病人 B. 成人 C. 老人 D. 妇女 E. 儿童
54. 急性血源性骨髓炎护理中不妥的是
- A. 患肢必须给与固定 B. 物理降温, 预防惊厥 C. 高蛋白, 高糖, 高维生素饮食
D. 体温正常后, 还应继续用抗生素 E. 体温正常后可下床活动
55. 患儿 7 岁。1 天来持续高热寒战, 左下肢活动受限。左小腿上端剧痛, 且有深压痛。血白细胞 $21 \times 10^9/L$, 中性粒细胞 90%。X 线片正常。6 天前有左膝碰伤史。最可能的诊断是:
- A. 左膝化脓性关节炎 B. 急性血源性骨髓炎 C. 急性蜂窝织炎
D. 膝关节结核 E. 创伤性关节炎
56. 对该病人的护理中不妥的是:
- A. 患肢必须给予固定 B. 物理降温, 预防惊厥 C. 高蛋白、高糖、高维生素饮食

- D. 体温正常后，还应继续用抗生素 E. 体温正常后可下床活动